

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Année 1959

N°

T H È S E

pour le

DOCTORAT EN MÉDECINE

(Diplôme d'État)

par

Claude, Albert Alexandre, FRÉAL

né le 1^{er} Août 1927, à Reims

Présentée et soutenue publiquement, le 17 Décembre 1959

LA TRICHOMONASE URO-GÉNITALE
EST - ELLE
UNE MALADIE VÉNÉRIENNE ?

Exposé des arguments actuels

Président : M. Robert MERGER, Professeur

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

1911

CHICAGO, ILL.

1911

CHICAGO, ILL.

1911

CHICAGO, ILL.

1911

CHICAGO, ILL.

1911

CHICAGO, ILL.

1911



Digitized by the Internet Archive
in 2026

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

Année 1959

N°

T H È S E

pour le

DOCTORAT EN MÉDECINE

(Diplôme d'État)

par

Claude Albert Alexandre FRÉAL

né le 1^{er} Août 1927, à Reims

Présentée et soutenue publiquement, le 17 Décembre 1959

LA TRICHOMONASE URO-GÉNITALE
EST-ELLE
UNE MALADIE VÉNÉRIENNE ?

Exposé des arguments actuels

Président : M. Robert MERGER, Professeur

FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

PROFESSEURS HONORAIRES :

MM. AUBIN (A.), BENARD (H.), BROcq (P.), BULLIARD (H.), CADENAT (F.), CHABROL (E.), CHAMPY (C.), CHEVALLIER (P.), DEBRE (R.), DONZELOT (E.), GASTINEL (P.), GUILLAIN (G.), HALPHEN (E.), HARVIER (P.), HAZARD (R.), HEUYER (G.), LANTUEJOUL (P.), LAROCHE (G.), LAUBRY (C.), LEVY-SOLAL (E.), LHERMITTE (J.), LIAN (C.), LOEPER (M.), MARION (G.), MATHIEU (P.), MOCQUOT (P.), MONDOR (H.), MONOD (R.), MOREAU (R.), MULON (P.), OLIVIER (E.), RICHT (C.), STROHL (A.), TANON (L.), VELTER (E.).

Doyen Léon BINET
Membre de l'Institut.

Asseuseur Jean VERNE.

I. — PROFESSEURS

	MM.	
Anatomie	CORDIER (G.)	
Anatomie (Chaire à titre personnel)	DELMAS (A.)	
Anatomie pathologique	DELARUE (J.)	
Anesthésiologie	BAUMANN (J.)	
Bactériologie	FASQUELLE (R.)	
Biochimie médicale	JAYLE (M.-F.)	
Biologie appliquée à l'Education Physique et aux Sports	CHAILLEY-BERT (P.)	
Biologie médicale	FAUVERT (R.)	
Cancérologie médicale et sociale	BERNARD (J.)	
Clinique carcinologique (Inst. G. ROUSSY) ..	REDON (H.)	
Clinique cardioiogique (Broussais)	MOUQUIN (M.)	
Cliniques chirurgicales {	SICARD (A.)	
	Beaujon	QUENU (J.)
	Cochin	MENEGAUX (G.)
	Hôtel-Dieu	GOSSET (J.)
Saint-Antoine	MOULONGUET (P.)	
Salpêtrière		
Clinique de chirurgie infantile et orthopédique (Enfants-Malades)	FEVRE (M.)	
Clinique chirurgicale orthopédique et réparatrice (Cochin)	MERLE-D'AUBIGNE (R.)	
Clinique de chirurgie cardio-vasculaire (Broussais)	GAUDART-D'ALLAINES (F. de)	
Clinique de chirurgie pleuro-pulmonaire (Laënnec)	MATHEY (J.)	
Clinique endocrinologique (Pitié)	DECOURT (J.)	
Clinique génétique médicale (Enfants-Malades)	LAMY (M.)	
Clinique gynécologique (Broca)	FUNCK-BRENTANO (P.)	
Clinique des maladies cutanées et syphilitiques (Saint-Louis)	DEGOS (R.)	
Clinique des maladies des enfants (Enfants-Malades)	CATHALA (J.)	
Clinique des maladies infectieuses (Claude Bernard)	MOLLARET (P.)	
Clinique des maladies mentales et de l'encéphale (Sainte-Anne)	DELAY (J.)	
Clinique des maladies métaboliques (Necker)	HAMBURGER (J.)	

Clinique des maladies du sang (Broussais) ..
 Clinique des maladies du système nerveux
 (Salpêtrière)
 Cliniques médicales } Broussais
 } Cochin
 } Hôtel-Dieu
 } Lariboisière
 } Pitié
 } Saint-Antoine
 Clinique médicale d'hydrologie thérapeuti-
 que et climatologie (Bichat)
 Clinique médicale propédeutique
 Clinique médico-sociale du diabète sucré et
 des maladies de la nutrition (Hôtel-Dieu)
 Clinique de neuro-chirurgie (Pitié)
 Cliniques obstétricales } Baudeiocque
 } Port-Royal
 } Tarnier
 Clinique ophtalmologique (Hôtel-Dieu)
 Clinique oto-rhino-laryngologique (Laribo-
 sière)
 Clinique de pédiatrie sociale (Enfants-Mala-
 des)
 Clinique de pneumo-phthisiologie (Laënnec) ..
 Clinique psychiatrique infantile (Salpêtrière)
 Clinique de puériculture (Saint-Vincent-de-
 Paul)
 Clinique de rhumatologie médicale et sociale
 (Cochin)
 Clinique stomatologique (Pitié)
 Clinique thérapeutique chirurgicale (Vaugi-
 rard)
 Clinique thérapeutique médicale (Saint-An-
 toine)
 Clinique urologique (Cochin)
 Electrophysiologie médicale (chaire à titre
 personnel)
 Embryologie
 Histoire de la médecine et de la chirurgie ..
 Histologie
 Hygiène des collectivités (chaire à titre per-
 sonnel)
 Hygiène et clinique de la première enfance
 (Trousseau)
 Hygiène et médecine préventive
 Médecine du travail
 Médecine légale
 Parasitologie
 Pathologie chirurgicale
 Pathologie exotique
 Pathologie expérimentale et comparée
 Pathologie humorale et immunologie expé-
 rimentale (chaire à titre personnel)
 Pathologie médicale
 Pathologie et thérapeutique générales
 Pharmacologie et matière médicale
 Physiologie
 Physiologie (chaire à titre personnel)
 Physique médicale
 Radiologie médicale
 Technique chirurgicale
 Thérapeutique

MARCHAL (G.)

ALAJOUANINE (T.)
 GENNES (L. de)
 JUSTIN-BESANÇON (L.)
 BARIETY (M.)
 SOULIE (P.)
 DREYFUS (G.)
 KOURILSKY (R.)

DEBRAY (G.)
 PASTEUR VALLERY-RADOT (L.)

DEROT (M.)
 PETIT-DUTAILLIS (D.)
 LACOMME (M.)
 N...
 VARANGOT (J.)
 RENARD (G.)

AUBRY (M.)

MARIE (J.)
 BERNARD (E.)
 MICHAUX (L.)

LELONG (M.)

COSTE (F.)
 DECHAUME (M.)

SENEQUE (J.)

LEMAIRE (A.)
 FEY (B.)

DJOURNO (A.)
 GIROUD (A.)
 N...
 VERNE (J.)

DEPARIS (M.)

TURPIN (R.)
 JOANNON (P.)
 DESOILLE (H.)
 PIEDELIEVRE (R.)
 GALLIARD (H.)
 COUVELAIRE (R.)
 LAVIER (G.)
 LENEGRE (J.)

MERKLEN (F.-P.)
 N...
 GARCIN (R.)
 CHEYMOL (J.)
 BINET (L.)
 BARGETON (D.)
 DOGNON (A.)
 DESGREZ (H.)
 PATEL (J.)
 BROUET (G.)

II. — PROFESSEURS SANS CHAIRE, PROFESSEURS AGREGES
ET MAITRES DE CONFERENCES-AGREGES

	MM.
Anatomie	{ CABROL (C.) COUINAUD (C.) OLIVIER (G.)
Anatomie pathologique	{ GAUTHIER-VILLARS (Mlle P.) pr. s. ch. BUSSEY (F.) GOUYGOU (Ch.) ORCEL (L.) PAILLAS (J.)
Anesthésiologie	VOURC'H (G.)
Bactériologie	{ NEVOT (A.) pr. s. ch. BARBIER (P.) CHRISTOL (D.) TOURNIER (P.)
Biochimie médicale	{ DESGREZ (P.) pr. s. ch. POLONOSKI (J.) m. conf. SCHAPIRA (G.) m. conf.
Biologie médicale	BOURLIERE (F.) m. conf.
Carcinologie	{ DENOIX (P.) MATHE (G.)
Dermato-Syphiligraphie	DUPERRAT (B.)
Electro-Radiologie	LEDOUX-LEBARD (G.)
Embryologie	TUCHMANN-DUPLESSIS (H.)
Hématologie	{ BILSKI-PASQUIER (G.) DAUSSET (J.)
Histologie	{ GOUJARD (R.) pr. s. ch. MAROIS (M.) RACADOT (J.)
Hydrologie	CORNET (A.)
Hygiène	{ BOYER (J.) pr. s. ch. GORRE-HURST (M ^{me} L.)

Maladies infectieuses	{	BASTIN (R.) DUPONT (V.)
Médecine légale	{	DEROBERT (L.) pr. s. ch. HADENGUE (A.) FOURNIER (E.) GUENIOT (M.)
Médecine du travail		ALBAHARY (C.)
Neuro-chirurgie		DAVID (M.)
Neurologie		LHERMITTE (F.)
Obstétrique	{	GRANJON (A.) HERVET (E.) LE LORIER (G.) MORIN (P.) MUSSET (R.) ROBEY (M.) THOYER-ROZAT (J.)
Ophthalmologie	{	BREGEAT (P.) SARAUX (H.)
Orthopédie	{	JUDET (R.) RAMADIER (J.)
Oto-rhino-laryngologie		DEBAIN (J.)
Parasitologie	{	BRUMPT (L.-C.) pr. s. ch. CHABAUD (A.)
Pathologie chirurgicale	{	BARCAT (J.) BINET (J.-P.) CAUCHOIX (J.) CHATELIN (C.-L.) DUBOST (Ch.) DUBOST (Cl.) FAUREL (J.) FLABEAU (F.) GERMAIN (A.) LAURENCE (G.) agr. per. LORTAT-JACOB (J.-L.) LOYGUE (J.) MERCADIER PERROTIN (J.) ROBERT (H.) THOMERET (G.)
Pathologie exotique		SCHNEIDER (J.)

Pathologie expérimentale	{ CROSNIER (J.) HARTMANN (L.) LOEPER (J.) MAURICE (J.) PLAS (F.) RICHEL (G.)
Pathologie médicale	{ AUSSANAIRE (M.) BOUR (H.) BOUVIER (J.) BOUVRAIN (Y.) BRICAIRE (H.) BRISSAUD (H.) BROCARD (H.) BUGE (A.) CASTAIGNE (P.) m. conf. CATINAT (J.) CONTAMIN (F.) COURY (C.) FREZAL (J.) HOUSSET (E.) LAROCHE (Cl.) LESOBRE (R.) MACREZ (C.) NICK (J.) PEQUIGNOT (H.) m. conf. ROYER (P.) WOLFROMM (R.)
Pédiatrie - Puériculture	{ JOSEPH (R.) MANDE (R.) MOZZICONACCI (P.) POLONOVSKI (C.) ROSSIER (A.)
Pharmacologie	{ LEVY (M^{lle} J.) pr. s. ch. BOISSIER (J.) LECHAT (P.)
Physiologie	{ PARROT (J.) pr. s. ch. DEJOURS (P.)
Physique médicale	GOUGEROT (L.) m. conf.
Pneumo phtisiologie	KREIS (B.)
Psychiatrie	PICHOT (P.)
Psychiatrie infantile	DUCHE (D.)
Rhumatologie	DELBARRE (F.)
Stomatologie	{ CERNEA (P.) CHAPUT (M^{me} A.) m. c. agr. GRELLET (M.)
Thérapeutique	{ CHASSAGNE (P.) LAMOTTE (M.)
Urologie	QUENU (L.)

III. — PROFESSEURS SANS CHAIRE ET AGREGES CHARGES DE COURS DE CLINIQUE ANNEXE à titre permanent

	MM.
Clinique chirurgicale	ABOULKER (P.)
	AMELINE (A.)
	HUGUIER (J.)
	LEGER (L.)
	OLIVIER (C.)
	PADOVANI (P.)
	POILLEUX (F.)
	ROUX (M.)
	VERNE (J.-M.)
Clinique médicale	HAGUENEAU (J.), pr. s. ch.
	BOUDIN (G.)
	CONTE (M.)
	DOMART (A.)
	MILLIEZ (P.)
	PERRAULT (M.)
	RAMBERT (P.)
	THIEFFRY (S.)
	TURIAF (J.)
Clinique neuro-rhumatologique	SEZE (S. de)
Clinique obstétricale	GRASSET (J.)
	LEPAGE (F.)
	MAYER (M.)
	MERGER (R.)
	RAVINA (J.)
Clinique ophtalmologique	DESIGNES (P.)
	OFFRET (G.)
Clinique oto-rhino-laryngologique	MADURO (R.)
Clinique pédiatrique et puériculture .	LAPLANE (R.)
Clinique psychiatrique	BARUK (H.)
Clinique urologique	KUSS (R.)

IV. — PROFESSEURS DETACHES DANS LES UNIVERSITES ETRANGERES

Bactériologie	HAUDUROY (P.) Pr. s. ch.
Biochimie médicale	ETTORIE (J.) Pr. à t. per.
Pathologie chirurgicale	RUDLER (J.) Pr. s. ch.
Secrétaire général de la Faculté	M. LENA (J.)
Secrétaires	M ^{me} BEURLAND (H.), M ^{lles} CHAIN- TREUIL (G.), HURE (A.)
Conservateur, chargé de la direction de la Bibliothèque	M. le Docteur HAHN (A.)
Conservateurs	M ^{lles} DUMAITRE (P.), GOICHON (A.-M.)
Bibliothécaires	M ^{me} CONTET (J.), M ^{lles} LAURENT (H.), LE NOIR (G.), QUIEVREUX (E.)

Par délibération en date du 9 décembre 1798, l'Ecole a arrêté que les opinions émises dans les dissertations qui lui seront présentées doivent être considérées comme propres à leurs auteurs et qu'elle n'entend leur donner aucune approbation ni improbation.

A Monsieur le Professeur MERGER

Gynécologue-accoucheur des Hôpitaux de Paris
Professeur de Clinique Obstétricale à la Faculté
de Médecine de Paris.

Qui m'a fait le très grand honneur
d'accepter la Présidence de cette
Thèse.

A mon Maître le Professeur CHAPPAZ

Gynécologue-accoucheur des Hôpitaux de Reims,
Professeur de Clinique Obstétricale à l'Ecole Nationale
de Médecine de Reims.

Dont la bienveillante sollicitude et
la compréhension me guident chaque
jour parmi les difficultés de la
clinique gynécologique et obstétricale.

En reconnaissance de l'enseignement
qu'il m'a prodigué et de la probité
intellectuelle et morale dont il m'a
donné l'exemple.

A mes Maîtres, Médecins, Chirurgiens et Spécialistes
des Hôpitaux de Reims.

Pour les enseignements et les
encouragements qu'ils m'ont
donnés au cours de mes années
d'Externat et d'Internat.

A mes Professeurs de l'Ecole Nationale de Médecine
et de Pharmacie de Reims.

A mes Professeurs de la Faculté de Médecine de Paris.

INTRODUCTION

EN 1916, quelque soixante-quinze années après que DONNE eut identifié le *Trichomonas Vaginalis*, l'Allemand HOEHNE (1), dans un ouvrage capital sur « *Le Trichomonas Vaginalis, agent pathogène d'une vaginite purulente typique et fréquente* », écrivait :

— tout médecin pratiquant un peu la gynécologie est frappé de l'existence de catarrhes vaginaux et de vaginités extrêmement rebelles, dans lesquelles on n'obtient guère de succès thérapeutiques durables, qui sont très pénibles pour les malades et mettent la patience des médecins à rude épreuve.

HOEHNE, suivi de quelques auteurs, ne remporta pas un bien grand crédit dans le monde médical et si les gynécologues adoptèrent la présence fortuite de ce flagellé, de fait, la gonococcie et les affections leucorrhéiques du post-abortum ou du post-partum dissimulaient par leur gravité le syndrome pathologique de ce nouvel hôte vaginal, auquel on n'eût guère, sans sourire, prêté le moindre pouvoir pathogène. . . .

Cependant, le *Trichomonas Vaginalis* va son chemin et sa pathologie se précise dans les travaux de NORVIN, KISSLING, ALLEN, HESSELSTINE, J.-B. DE LEE, LYNCH, HEGNER, HARTWELL, SCHMID et KAMNIKER, RODECURT, BLAND, au Congrès de Philadelphie en 1932.

Il faut attendre la fin de la guerre pour que paraissent quelques ouvrages fondamentaux qui vont diffuser par le monde les notions éparpillées dans de nombreux pays :

- En Argentine, PEREZ et BLANCHARD, 1944 (2).
- Aux U.S.A., RAY et TRUSSELL, 1947 (3).
- En France, G. CHAPPAZ et CHATELLIER, 1951 (4).
- En Grande-Bretagne, HARKNESS, 1951 (5).
- En Italie, G.-B. CANDIANI, 1953 (6).

Par ailleurs, la découverte des antibiotiques ayant résolu de façon considérable l'importance et la chronicité des affections bactériennes allait permettre une étude approfondie du rôle pathogène du flagellé isolé et faciliter les cultures pures en laboratoire et les inoculations expérimentales.

L'intérêt porté au parasite devient tel, que cet hôte vaginal est l'objet en septembre 1954 d'un Symposium, tenu à Monaco, qu'ouvrent paradoxalement vénérologues et parasitologues, sous le titre « Symposium sur les urétrites non gonococciques » (7) où de nombreux auteurs érudits étrangers vont consacrer la fréquence et l'importance de la trichomonase urinaire masculine.

Un Symposium sans réunion fait suite à celui de Monaco, sous l'autorité du Docteur FÉLIX IBANEZ, Président of M.D. publications in New-York, dont les travaux sont publiés par Herbert KUPPERMAN, M.D. de la New-York University College of Medicine (8).

Les rapports sont présentés par :

G.N. PAPANICOLAOU et WANDL WOLINSKA, W. FILLER, W. BARFIELD, J. DRAPER, A. KUPFERBERG, Sophia KLEEGMAN, I. IGER et H. KUPPERMAN, et exposent des idées nouvelles. Ils sont suivis de nombreux écrits et publications de :

C. CUCKLER (9), Gisella PERL (10), G. ROGERS (11), J. LYNCH (12), A. PLENTI (13), KEAN (14), FEO (15), LEE BUXTON (16).

Enfin, en 1957, en France, sous l'initiative de G. CHAPPAZ, s'ouvre à Reims, réunissant pour la première fois des gynécologues, des urologues, des vénérologues, des parasitologues, des biologistes, des vétérinaires, des gastro-entérologues, de vingt-et-une nations, le premier « Symposium International sur les Infestations à Trichomonas », sous le haut patronage de la Société Française de Gynécologie. Le volume des Rapports présentés a été édité sous le titre : « Les Infestations à Trichomonas » (17).

C'est avec cette énorme documentation et en nous référant largement au rapport de G. CHAPPAZ, présenté au « Premier Symposium canadien sur les urétrites non gonococciques et la trichomonase humaine » tenu à Montréal en septembre 1959, que nous proposons de préciser les notions qui s'actualisent concernant l'épidémiologie et la contamination du trichomonas vaginalis chez la femme.

NOTIONS D'ÉPIDÉMIOLOGIE

NOUS exposerons la fréquence de la Trichomonase génitale humaine en reprenant la classification des auteurs d'avant-garde qui s'ingéniaient à distinguer des variations épidémiologiques selon :

les pays,
les saisons,
les races,
et les milieux sociaux.



a) Répartition géographique

Les quelques tableaux que nous rapportons donnent une opinion de la répartition géographique du *Trichomonas Vaginalis* avant 1955.

Cependant, en pratique, il semble bien actuellement que tous les pays soient également infestés et quoique la fréquence géographique du parasite ait perdu de l'intérêt, du moins dépend-elle de la valeur des techniques de détection employées sur lesquelles nous reviendrons.

TABLEAU I

<i>Femmes non gravides</i>			
ANDREWS	U. S. A.	20	%
ANDREIOS	»	20	%
BUXTON	»	31	%
PETERSON	»	24,6	%
STEIN & COPPE	»	10	%
POTTER	»	18,4	%
HEGNER	»	50	%
ANGELUCCI	Italie	17	%
BLANCHI	»	21	%
PIROTA	»	25	%
FERNANDO Luis	»	40	%
DEBIASI	»	44	%
BURGER	France	53	%
TEMPE	»	32,6	%
RIFF	»	20	%
KISSLING	Suisse	32	%
KISSLING	»	6,6	%
EAST (2)	Canada	20	%
PONOSCHINA	U.R.S.S.	29	%
HOEHNE	Allemagne	23	%
RODECURT	»	88	%
HAUSSMANN	»	40	%
MOHR	»	62	%
SCHMID & KAMNIKER	»	69	%
WILLE (1)		40	%
REULING (1)		18,4	%
TRACHGOTT (1)		50	%
YUNG WU		34,9	%
Manuel Luis PEREZ & BLANCHARD	Argentine	35,5	%
Varela ZEQUEIRA	»	11,1	%
NICOL	Grande-Bretagne	49,6	%
COLLIS & KARNAKY	»	37,04	%

(1) Uniquement chez les leucorrhéiques.

(2) Sur 1.712 mal. vénérologie (VANCOUVER)

Femmes non gravides

KUCERA & KRAL	Tchécoslovaquie	48,9	%
JIROVEC	»	32,2	%
FUKUSHIMA	Japon	15	%
MAKARA & RECHNITZ	Hongrie	15,4	%
GOLDBERGER	Pologne	4	%

TABLEAU II

Femmes gravides

U.S.A.	{	BLAND & RAKOFF	91	%
		BLAND, GOLDSTEIN & WEN-		
		RICH	23,6	%
		POTTER	17	%
		TUCKER, TRUSSEL & PLASS	24	%
		LISTON & CRUICKSHANK .	37,5	%
		ANDREWS	38,4	%
		TRUSSEL, WILSON, LONG-		
		WELL & LANGHLIN	27,5	%
		BROOK & BLAND	23,6	%
Allemagne	{	HAUSSMANN	37	%
		HOEHNE	34	%
		SEITZ	30	%
		LISS	19	%
		TRAUGOTT	21	%
		GRAGERT	25	%
		BERNSTINE	10,56	%
France		BRUMPT	10	%
Italie		ROLLIERI	34,5	%
Chili		Correa MENDES	30	%
		LIDDO	12,5	%
Roumanie		SZENDI	44	%
Tchécoslovaquie		JIROVEC	42,7	%
Japon		FUKUSHIMA	33,8	%

TABLEAU III

Cas publiés de Trichomonase masculine d'après H. BAUER
Répartition géographique des cas publiés

<i>Europe Centrale : 361</i>		<i>Europe de l'Ouest : 345</i>	
Danemark	3	France	128
Allemagne	351	Grande-Bretagne ...	217
Autriche	6		
Suisse	1	<i>Europe de l'Est : 1.138</i>	
<i>Europe du Nord : 6</i>		C.S.R.	183
Finlande	4	Pologne	66
Suède	2	U.R.S.S.	836
<i>Europe du Sud : 48</i>		Hongrie	17
Italie	44	Roumanie	2
Espagne	4	Yougoslavie	34
A) Europe	1.898		
B) Amérique du Nord ..	864		
C) Amérique Centrale ..	270		
D) Amérique du Sud	1.877		
E) Afrique	38		
F) Asie	16		
G) Australie	1		
Total		4.964	cas publiés

Ces quelques tableaux statistiques prouvent à suffisance que le *Trichomonas Vaginalis* n'a épargné aucun continent, ce que signifiait déjà TRUSSEL en 1947 dans son remarquable ouvrage où, regroupant les statistiques de 45 auteurs, il situait à 8,6 % le pourcentage moyen des japonaises infestées, à 53,6 % celui des françaises et entre 20 et 25 % la moyenne aux U.S.A., soit environ 10 millions de femmes parasitées dans ce pays. Tous ces résultats compilés par TRUSSEL permettaient déjà d'affirmer l'universalité du flagellé sans qu'il soit possible de lui situer à coup sûr un lieu d'origine.

Cependant, il convient devant tous ces résultats de formuler quelques réserves.

I

On relève dans un travail de PETER, publié en 1945 en Tchéco-Slovaquie, 1,93 % de femmes infestées alors que l'année précédente, KUCERA et KRAL dans le même pays publiaient de leur côté un travail statistique concluant à 48,9 % d'infestation. Or, les deux auteurs précisent la qualité du matériel féminin qu'ils détectent, l'un s'étant adressé à 155 étudiantes saines et vierges pour la plupart, l'autre à 350 consultantes de gynécologie atteintes de leucorrhée. C'est ainsi qu'en parcourant rapidement les tableaux ci-dessus, les pourcentages varient de 4 % (GOLDBERGER, Pologne) à 88 % (RODECURT, Allemagne) chez les femmes non gravides et de 10 % (BRUMPT, en France) à 91 % (BLAND et RAKOFF aux U.S.A.) chez les femmes gravides. Que conclure ? sinon que des pays sont largement infestés alors que d'autres sont épargnés ou bien que l'imprécision relative de ces statistiques ne fournit de fait aucune conclusion comparative aux travaux de PETER et KUCERA.

Cette remarque a déjà été faite spontanément par les auteurs les plus récents, car on recueille actuellement des travaux de plus en plus précis. Citons, par exemple, l'enquête de Yale University School of Medicine, dont les résultats ont été rapportés au 6^e Congrès des obstétriciens et gynécologues de Los Angeles, en avril 1958, par C. LEE BUXTON, David WEINMAN, Carl JOHNSON (16) sous le titre : « Epidemiology of Trichomonas Vaginal Vaginitis ». Ces travaux peuvent être résumés comme suit :

Groupes examinés systématiquement dans un milieu social normal.

1) Employées d'une compagnie d'assurances de 29 à 69 ans :

sur 465 femmes examinées	fréquence du T.V.
mariées 2/3	6,3 %
célibataires 1/3	1,4 %

2) Examens systématiques des femmes de clientèle privée de la Yale Medical School :

575 femmes, de 16 à 70 ans	Résultat sur l'ensemble :
mariées 80 %	6,9 %

(mais les auteurs reconnaissent que certaines de ces femmes avaient consulté pour leucorrhée).

3) *Femmes isolées dans des établissements :*

Il s'agit de 715 pensionnaires d'un Institut de Psychothérapie, de 16 à 89 ans :

411 étaient isolées depuis 5 ans au minimum ;

304 étaient isolées depuis moins de 5 ans.

Résultat d'ensemble : 15 %.

4) 221 *prisonnières*, depuis six semaines à plusieurs années, issues d'un milieu social médiocre et souvent prostituées :

Résultat d'ensemble : 70 %.

5) *Personnel subalterne d'un Collège de filles :*

157 femmes âgées de 20 à 22 ans, dont 10 seulement mariées :

Résultat : néant.

Cependant, G. CHAPPAZ, rapporteur au Symposium canadien de septembre 1959, regrette que des sélections comme celles précitées ne soient pas publiées avec des groupages plus étroits encore, permettant d'apporter une contribution efficace aux recherches pathogéniques et il propose de sous-grouper :

- les femmes de 1), 2), 3) et surtout 5) en vierges et non vierges,
- les femmes de 1), 2), 3), 4) en moins de 55 ans et plus de 55 ans,
- les femmes de 2) en ayant consulté pour leucorrhée ou examinées par routine,
- les femmes de 3) et 4) par exemple en : isolées depuis :
 - moins de 3 mois,
 - moins de 1 an,
 - moins de 5 ans,
- les femmes de 4) en : prostituées et non prostituées.

Il conclut sur une proposition simple et commode que nous reproduisons et qui introduirait de la clarté dans les recherches sur l'épidémiologie.

Les titres des groupages de fréquence pourraient être :

- 1) Femmes examinées au hasard dans une collectivité, non vierges et en âge d'activité génitale,
- 2) Femmes se plaignant de leucorrhée,
- 3) Femmes gravides examinées toutes systématiquement,
- 4) Femmes gravides se plaignant de leucorrhée.

Auxquels titres pourraient faire suite d'autres tableaux de recherches précises telles que :

- 1) Fillettes, de la naissance à un mois (contamination au passage),

- 2) Fillettes, avant les premiers symptômes de prépuberté,
- 3) Femmes vierges,
- 4) Femmes, après castration chirurgicale,
- 5) Femmes, après deuxième période de ménopause,
- 6) Femmes, atteintes de cancer du col,
- 7) Prostituées, etc...

II

A cette première réserve, on peut en ajouter une seconde :

La recherche du *Trichomonas Vaginalis* est souvent difficile à pratiquer dans les urines car fréquemment le parasite change de morphologie, les flagelles disparaissent, la mobilité est moins grande ou nulle.

Il est alors bien insuffisant de pratiquer une recherche à l'état frais et c'est aux cultures et aux colorations du type May-Grünwald-Giemsa modifié qu'il est nécessaire d'avoir recours. La recherche négative du flagellé dans le vagin par examen à l'état frais doit évidemment bénéficier des mêmes techniques de détection.

Néanmoins, la recherche à l'état frais est la plus commode, la moins onéreuse et la plus rapide ; elle suffit dans la grande majorité des cas. Est-ce cette seule méthode que certains auteurs cités aux tableaux I et II ont employée ? D'autres ont-ils fait appel à des moyens plus rigoureux qui expliquent les différences considérables dans les pourcentages proposés ? Cela paraît bien vraisemblable.

Pour terminer, notons que l'irrigation vaginale simple ou légèrement antiseptique accompagnée d'une toilette vulvaire soigneuse est aussi une autre cause d'erreur, explicitée par les faibles pourcentages accordés aux prostituées par différents auteurs. Le pH vaginal est là un adjuvant indispensable qui évitera bien des inexactitudes. La recherche systématique dans le tractus urinaire en est un autre.

b) Fréquence selon les saisons

Il semble difficile d'admettre la possibilité d'une contamination plus grande en été et moindre en hiver.

HESS (18) et RODECURT (19) pensaient avoir remarqué que le flagellé était plus fréquent en été et expliquèrent ce fait par

la pratique des bains, en l'occurrence dans le Rhin. Ils pensaient d'ailleurs avoir décelé dans ce fleuve des formes du parasite.

Au Symposium de Reims, Manuel PEREZ et BLANCHARD (17) conviennent de l'imprécision de ces résultats, aucune statistique suivie pendant des années n'ayant été publiée. G. CHAPPAZ partage cet « avis prudent » et fait remarquer que nous ne connaissons que rarement le début de l'infestation et que lorsque nous détectons une femme, celle-ci est parfois contaminée depuis des années. Comment savoir, conclut-il, si ce fut en hiver ou en été ?

c) Fréquence selon les races

DOS SANTOS ZAGURY (20) ont trouvé le *Trichomonas Vaginalis* dans :

29,9 % des cas chez la femme blanche,

54,87 % chez la métisse,

27,7 % chez la femme noire.

KARNAKY (21) signale :

24 % chez la femme blanche,

46,3 % chez la négresse.

FEO (15), en examinant le sédiment urinaire des hommes, notait :

16,64 % chez les noirs,

12,04 % chez les blancs.

Et ROTH (22) en examinant des hommes au hasard :

27,4 % chez les noirs,

4 % chez les blancs.

Ces quelques travaux paraissent prouver la plus grande fréquence dans la race noire. Mais BAUER (Symposium de Monaco) et G. CHAPPAZ (Symposium de Montréal) pensent que ce sont les raisons sociales avec les manquements à l'hygiène qui sont la cause de cette différence.

Ce dernier rapporte qu'en 1959, à Bangkok, CHARAUPAT-ISIRANGKUN partageait son avis et pensait que sa population hospitalière de l'hôpital Chulalong Korn était probablement infestée en totalité et cela pour les mêmes raisons.

d) Fréquence selon les milieux sociaux

K. KUCERA a relevé les résultats suivants de différents auteurs :

Femmes socialement misérables

Auteurs	Année	Pays	Catégorie	Nbre exact	%
CROWN	1933	U. S. A.		100	59
BUXTON & SHELANSKI	1937	»		106	48,1
ANDREWS	19 8	»			50
KARNANG	1940	»			46,3
CORBIT, Mc ELROY & CLERCK	1941	»		1.883	47,7
FEO	1953	»		500	43,6
LAMBILLON KANGI, PE- TEPETE	1954	Congo Belge	Afr. de Léopoldville		37,7
			Afr. de Léopoldville gravides		46,5
			Afr. de Ipa Kasai)	1.340	31,3
			Afr. de Ipa Ruanda)		44
			Afr. de Ipa (gravid.)		54

PEREZ et BLANCHARD font remarquer que les femmes, dans les milieux évolués, s'inquiètent facilement de leurs désagrémentsex génitaux et consultent volontiers alors que les statistiques de clientèles privées sont rarement établies. Par ailleurs, les moyens anticonceptionnels employés dans les milieux favorisés ont une action empêchante sur la contamination. L'un de ces auteurs propose cependant la statistique de sa clientèle privée établie sur 500 femmes et révélant 32 % d'infestées.

On peut donc conclure avec G. CHAPPAZ que la misère sociale n'augmente la fréquence de la trichomonase féminine que parce que la prophylaxie et la thérapeutique ne sont pas organisées collectivement chez les pauvres, alors qu'elles préservent les femmes aisées, individuellement.

II

LA CONTAMINATION

NOUS examinerons au cours de ce chapitre sur la contamination trois éventualités :

- 1) l'auto-contamination d'origine digestive,
- 2) la contamination extra-sexuelle,
- 3) la contamination par les rapports sexuels.

I. L'auto-contamination d'origine digestive

On sait que des trichomonas peuvent parasiter la bouche ; trichomonas tenax (syn. : *T. elongata*) ; le tube digestif : trichomonas intestinalis (syn. : *T. hominis*). Dès lors se posent les questions suivantes :

Ces espèces peuvent-elles parasiter le vagin et provoquer une infestation vaginale pour leur propre compte ?

Sont-ce des espèces différentes du trichomonas vaginalis ?

Sinon sont-elles si proches du trichomonas vaginalis qu'elles peuvent sans difficulté s'adapter au milieu vaginal ?

Il semble bien que la question ait été définitivement résolue au Symposium de Reims où ont été examinés les arguments que nous allons exposer :

1. — LA DIFFERENCE DE FREQUENCE ENTRE LA TRICHOMONASE DIGESTIVE ET LA TRICHOMONASE URO-GENITALE.

Il semble que dans certains pays la trichomonase du tube digestif soit assez répandue, le trichomonas intestinalis étant souvent considéré comme un parasite d'accompagnement des amibes ; en France cependant :

CATTAN rapporte qu'il m'a rencontré le trichomonas intestinalis qu'exceptionnellement.

DUBARRY, dans son Service de gastro-entérologie, n'a jamais rencontré de trichomonas intestinalis dans les selles ou dans le rectum de femmes atteintes de trichomonase génitale.

VAGUE s'étonne de la fréquence de la parasitose génitale et de la grande rareté des troubles digestifs rencontrés, paradoxe que BAUMEL et FASSIO au Symposium de Reims considèrent comme le fait dominant. Dans leur rapport, ils situent l'infestation digestive par le trichomonas intestinalis à environ 2 % des malades ayant consulté pour troubles digestifs.

Si l'on admet à 10 % la moyenne des femmes infestées en France par la trichomonase uro-génitale, comment expliquer cette différence de fréquence entre les deux parasitoses, alors que l'auto-contamination devrait être la règle, tant la promiscuité des portes d'invasion la rendrait fatale ?

Par contre, la fréquence de Trichomonas Tenax serait beaucoup plus grande. Elle est estimée à 75 % par SIMITCH ; MANDOUŁ PESTIRE de leur côté n'évaluent qu'à 16 % l'infestation de certaines régions de Yougoslavie ; mais nombre de femmes abritant le flagellé dans la bouche ne sont pas parasitées dans le vagin ou inversement.

Co-existence de <i>T. vaginalis</i> , <i>T. intestinalis</i> et <i>T. tenax</i>						
Auteurs	Année	Catégorie	Nbre examiné	% T. V.	% TT ou TH	Co-exist.
a) <i>Trichomonas hominis</i>				T. V.	T. H.	
STEIN & COPE	1933	Colpité	58	3	3	3
BLAND & RAKOFF ..	1937	Gynécol.	200	23.5	1.5	1
KUCERA & JIROVEC	1942	Hospitalis.	148	14	0,67	1
		(filles avec leucorrhée)	56	42	0	0
b) <i>Trichomonas tenax</i>					T. I.	
STEIN & COPE	1933	Colpité	58	100	3	3
BLAND & RAKOFF ..	1937	Gynécol.	200	23.5	16.5	9
LISTON & LISTON ..	1939	Gynécol.	200	45	3	-
KUCERA & JIROVEC	1942	Gynécol.	85	32,9	10.6	2

Dans ce tableau, établi par K. KUCERA (17), on remarque que la coïncidence du trichomonas vaginalis avec le trichomonas intestinalis ou le trichomonas tenax est exceptionnelle.

2. — LES INOCULATIONS EXPERIMENTALES.

Nous rapportons les expériences capitales de WESTPHAL (23), qui après avoir vérifié, à la suite d'examens répétés pendant trois ans, qu'il n'hébergeait pas de trichomonas dans sa bouche ni dans son intestin :

1° absorba à plusieurs reprises des souches de trichomonas vaginalis sans pouvoir trouver trace dans la suite des parasites ingérés ;

2° ingéra ensuite à quatre reprises des souches de trichomonas tenax et parasita rapidement sa bouche, laquelle demeura infestée très longtemps, sans toutefois découvrir de trichomonas dans l'intestin ;

3° absorba enfin deux cultures de trichomonas intestinalis qui parasitèrent rapidement son tube digestif, ses selles demeurant positives pendant cinq mois.

STABLER, FEO, RAKOFF (24), BONESTELL (25) procédèrent eux aussi, mais sans succès, à des essais de transplantation de souches cultivées loin de leur lieu d'origine.

BAUER a tenté de pratiquer des inoculations expérimentales dans le système uro-génital d'hommes et de femmes à partir des trois espèces de trichomonas.

Il rapporte ses essais infructueux et ceux de plusieurs auteurs (26), auxquels il consacre un rapport au Symposium de Monaco (7).

Tous ces travaux ne sont pas postérieurs à 1954 et BAUER y indique les résultats suivants :

	Résultats positifs
Inoculation de <i>Trichomonas vaginalis</i> en culture pure, 190 sujets	52,10 %
Inoculation de <i>Trichomonas vaginalis</i> en culture impure, 108 sujets	76,85 %
Inoculation de <i>Trichomonas intestinalis</i> 91 sujets	2,2 %
Inoculation de <i>Trichomonas tenax</i>	18,9 %

BAUER conclut : « la provenance rectale des Trichomonas qui se rencontrent dans l'appareil génito-urinaire, autrement dit ayant une origine imputable aux trichomonas de l'intestin, est absolument invraisemblable ».

3. — RECHERCHES DE PROTISTOLOGIE

MANDOUL et PESTRE au Symposium de Reims (pp. 228-32) ont rapporté un travail précis sur les différences morphologiques et les caractères biologiques qui distinguent les trois espèces de trichomonas, s'opposant ainsi à la thèse de l'identité des trois parasites soutenue en particulier par DOBELL (27).

a) DIFFERENCES MORPHOLOGIQUES.

1° *Trichomonas vaginalis* (DONNE 1836).

Taille 13 à 15 μ et au-dessus. Noyau ovalaire avec un discret caryosome subcentral dans un halo clair. Petits grains de chromatine assez uniformément répartis ; quatre chromosomes d'après POWELL.

Blépharoblaste unique, peu volumineux, quatre flagelles antérieurs aussi longs que le corps ; costa fine de même longueur ; axostyle mince, de structure fibrillaire, proéminent postérieurement en un aiguillon fin et très pointu. Appareil parabasal bien développé, incurvé sur le noyau ; son bord interne est prolongé par un délicat filament.

Dans le cytoplasme, grains sidérophiles disposés surtout le long de l'axostyle et de la costa ; pas de vacuoles alimentaires ; cytostome peu net, souvent invisible.

2) *Trichomonas hominis* (DAVINE 1860), (syn. *intestinalis*).

Taille 7 à 8 μ en moyenne. Noyau arrondi, à chromatine disposée en couche mince contre la membrane nucléaire, granules chromatiques peu nombreux ou absents, caryosome subcentral plus visible que dans *trichomonas vaginalis* ; cinq chromosomes d'après BISHOP.

Deux blépharoblastes, de tailles inégales, donnent naissance à cinq flagelles antérieurs plus longs que le corps ; quatre naissent ensemble du plus gros, le cinquième est engendré par le plus petit ; des variations individuelles ramènent parfois ce nombre à quatre et même à trois.

Membrane ondulante longue, bordant le corps jusqu'à son extrémité postérieure où le flagelle récurrent devient libre ; costa fortement marquée et de diamètre irrégulier ; axostyle tubulaire, sorte de tige hyaline faisant saillie à la partie postérieure du corps en un éperon pointu.

Appareil parabasal non visible.

Granulations cytoplasmiques le long de la costa et autour du noyau ; vacuoles alimentaires ; cytostome bien visible au pôle antérieur, du côté opposé à la membrane ondulante.

3) *Trichomonas tenax* (STENBERG 1862), (syn. *elongata*).

Taille de 6 à 7 μ . Noyau arrondi à nombreux granules de chromatine régulièrement répartis ; trois chromosomes d'après HINSHAW.

Blépharoblaste unique ; quatre flagelles antérieurs ; membrane ondulante moins longue que le corps ; costa fine ; pas de flagelle postérieur libre ; axostyle tubulaire terminé en pointe saillante.

Appareil parabasal comme dans *trichomonas vaginalis*.

Granules sidérophiles se disposant dans le cytoplasme en une véritable rangée le long de la costa ; quelques vacuoles alimentaires, cytostome bien visible.

En résumé, *trichomonas tenax* et *trichomonas vaginalis* sont proches morphologiquement ; *trichomonas hominis* est plus dissemblable.

b) DIFFERENCES DANS CERTAINS CARACTERES BIOLOGIQUES.

1° Le *trichomonas vaginalis* se cultive plus difficilement que *trichomonas intestinalis* et *trichomonas tenax*. Il ne se développe pas à la température du laboratoire et ne pousse qu'avec addition de sérum aux milieux de culture.

2° Les résistances dans les milieux extérieurs ne sont pas semblables :

Le *trichomonas intestinalis* résiste :

24 heures entre -12° et -18° ,

30 heures dans l'eau à 18° ;

Le *trichomonas vaginalis* est fragile et résiste :

1 heure dans l'eau entre 18° et 29° .

(LAPIERRE, Symp. de Reims),

ALLEN (28), TRUSSEL (3).

Pour conclure, on peut admettre, après les arguments que nous venons d'exposer sur la différence de fréquence, les inoculations expérimentales, la spécificité des *trichomonas* humains, que la majorité des auteurs ne retient plus la possibilité d'une auto-contamination d'origine digestive dans le cadre de la trichomonase uro-génitale.

II. La contamination Extra-Sexuelle

Nous considérerons successivement au cours de cet exposé :

1° Les foyers de contamination extra-vénériens proposés par différents auteurs :

2° La résistance du trichomonas vaginalis aux facteurs extérieurs ;

3° Ce qu'on peut penser actuellement des formes enkystées ;

4° Ce qui semble, après cette étude, pouvoir être écarté et ce qu'on en peut conclure.

1. — NOMBRE D'AUTEURS ONT RETENU DES FOYERS DIVERS DE CONTAMINATION.

a) *Les objets de toilette, les linges souillés* sont admis par une majorité d'auteurs de RODECURT (30), STEIN & COPPE (31) à CANDIANI (6) ;

b) *Les sièges de cabinets, les bidets*, cités par DEBIASI (32), sont parfois retenus dans une proportion étonnante ; MAC CULLAGH (33) leur impute 60 % des cas de contamination ;

c) *La visite gynécologique* elle-même a été retenue par OTTOLENGHI-PRETI (Symposium de Reims).

d) *L'eau des fleuves, les eaux stagnantes, les douches génitales* ont été proposées par RIFF (34), LOIZAGA (35), ACKERMANN (36), HEES (18). BYKOWSKY & GOUCHANSKY (37) accusent les eaux dans 62 % des cas. Signalons toutefois que WEILLER (38) en 1938 n'est jamais parvenu à déceler le trichomonas vaginalis dans les eaux de l'établissement balnéaire de Fribourg pas plus que WU YUNG (39) dans le canal de Hambourg et rappelons, pour partager cette controverse, que RODECURT aurait découvert le trichomonas vaginalis sur des fruits et des légumes ;

e) *Les animaux domestiques*.

Il semble bien établi que tous les essais d'implantation de trichomonas d'animaux domestiques (BAUMER BILL & MORGAN (40), en ont dénombré 93 espèces) dans le vagin de la femme, se soient soldés par un échec. Il est vrai d'ailleurs que les tentatives d'implantation de trichomonas vaginalis à l'animal sauf chez le macacus rhesus, HEGNER & RATCLIFFE sont toujours elles aussi restées vaines. Cette hypothèse ne semble donc plus être retenue actuellement.

2. — LA RESISTANCE DES TRICHOMONAS VAGINALIS AUX FACTEURS EXTERIEURS.

Il est bien évident qu'il faut supposer au parasite qui attend pour s'implanter dans le vagin des possibilités de survie suffisante dans les différents foyers que nous venons d'envisager. Ce sont ces possibilités que nous exposerons tout d'abord, nous référant aux travaux de LAPIERRE, MICHALZIK, BOCCI & DURANDO, SCHMIDT - HENSCHDORF, KUCERA, présentés au Symposium de Reims.

Le trichomonas vaginalis ne vit qu'une heure dans l'eau entre 18° et 29° (alors que le trichomonas intestinalis peut survivre 30 heures dans l'eau à 18°). C'est DEPORTER (42) qui a observé le comportement du parasite dans l'eau à partir d'une solution de chlorure de sodium à 9 pour 1000. Lorsque la concentration en NaCl est de 4 pour 1.000, en 30 minutes, le parasite est en état de mort apparente, perd ses flagelles, devient rond et gros ; à 3 pour 1.000 le gonflement augmente et à une concentration moindre le trichomonas est transformé en un sac gorgé d'eau sans structure reconnaissable.

LAVIER, que cite KUCERA, WU (39) et WILLE (43) n'ont jamais pu mettre en évidence le trichomonas dans les eaux stagnantes ou dans les rivières. LAPIERRE a étudié le comportement à basses températures des trichomonas.

Le trichomonas intestinalis résiste 24 heures à une température comprise entre —12° et —18°.

La résistance au froid serait très différente entre trichomonas intestinalis et trichomonas vaginalis puisque G. CHAPPAZ n'observe plus de trichomonas vaginalis vivant après quelques heures d'exposition à 0° dans du sérum physiologique.

La chaleur tue rapidement le trichomonas en culture. Il meurt :

en quelques minutes à 55°,

en 15 à 20 minutes à 50°,

en quelques heures à 45°,

une goutte de sécrétion infestée exposée deux minutes au soleil à une température de 45°, ne montre plus que des trichomonas vaginalis tués (G. CHAPPAZ).

Il est certain, après l'exposé rapide que nous venons de faire sur la résistance du trichomonas aux facteurs extérieurs que dès la sortie du corps, le trichomonas vaginalis se trouve être dans des conditions très défavorables de pH, d'humidité, de

température pour que la transmission habituelle puisse s'accommoder de supports tels que vêtements, objets de toilette, instruments souillés d'urine ou de sperme infestés. KUCERA a d'ailleurs étudié la survie du flagellé dans l'urine. Il l'estime à 3 heures à une température comprise entre 4° et 28°, JIROVEC, de son côté, à 24 heures à 20°.

Dans le sperme, le *trichomonas vaginalis* survit 6 heures (KEUTEL (44)).

Bien que des essais systématiques n'aient pas été pratiqués, des sécrétions vaginales infestées étendues sur du bois, diluées d'urine ou de sérum physiologique ne renferment plus que la moitié des parasites après une heure d'exposition (JIROVEC & PETER, 1945). 6 heures après, on peut en trouver 4 % de vivants (KESSEL & THOMSON). Le contenu de pertes infestées étendu sur des blocs de bois dans des conditions normales d'humidité et de température permet d'étudier la résistance du *trichomonas* comme suit (KESSEL & THOMSON (45)) :

Après 45 minutes on observe 100 % de survie,

Après 60 minutes on observe 60 % de survie,

Après 3 heures on observe 56 % de survie,

Après 6 heures on observe 4 % de survie,

Après 7 heures on observe 0 % de survie.

Signalons après ce tableau que WILSAR (45) n'a jamais trouvé de *trichomonas* vivants sur les sièges des cabinets publics, pas plus que JIROVEC & PETER n'en ont découvert au-delà de 60 minutes sur les essuie-mains et de 90 minutes dans une éponge.

KEUTEL & NEUMANN (44) ont insisté sur les variations morphologiques du *trichomonas* qui se transforme en corpuscule arrondi, en saucisse, sans flagelles, difficile à reconnaître à l'état frais mais que des colorations appropriées telle que le May-Grünwald-Giemsa modifié mettent en évidence. Ces « formes de résistance », qui peuvent apparaître dans des milieux défavorables, sont interprétées par différents auteurs dont G. CHAPPAZ comme des formes de souffrance, de dégénérescence. Il est certain que de telles variations rendent la détection du *trichomonas vaginalis* difficile en particulier dans les voies urinaires et, quoique les urines ne soient pas pour le flagellé comparables au milieu nutritif vaginal, il peut cependant y végéter, s'adapter en diminuant ses besoins, en faisant varier sa forme, en économisant l'énergie de sa motilité et de son agressivité; ces formes de souffrance ne faisant qu'affirmer la longévité du parasite.

La vulnérabilité des formes végétantes tapies dans des repaires externes ou internes serait beaucoup moins considérable car les parasites sont difficilement atteints par les agents trichomonacides.

Bocci explique ainsi les insuccès thérapeutiques « sur des femmes soumises à des traitements multiples, et de plus incomplets, ce qui confirmerait non seulement l'insuffisance de la thérapeutique mais aussi la possibilité d'acquisition d'une certaine résistance aux médicaments ». D'autre part, « les insuccès thérapeutiques sur les vaginites présentant un état évident de dystrophie de l'épithélium, ce qui ferait penser à un rapport de cause à effet entre les conditions plus ou moins défavorables de l'ambiance vaginale et la présence des formes de résistance ». Enfin, « les résultats bien meilleurs obtenus sur les vaginites de forme aiguë par rapport à ceux obtenus sur les formes subaiguës ou chroniques ».

Rappelons que G. CHAPPAZ a observé ces passages morphologiques progressifs sous le microscope en testant la sensibilité du trichomonas vaginalis aux divers trichomonacides.

Après l'exposé rapide de ces nombreux travaux consacrés aux foyers extra-vénériens de contamination et à la résistance du flagellé aux facteurs extérieurs, on peut poser en conclusion :

1° que le trichomonas vaginalis ne résiste que quelques heures dans l'eau,

que la durée de survie dans ce milieu, comme dans tous autres, diminue avec la température,

que le prélèvement vaginal ou urinaire infesté exposé à l'air libre est rapidement débarrassé de tout parasite, d'autant plus vite que l'exposition est ensoleillée ;

2° que la plupart des publications concernant la présence de trichomonas vaginalis dans l'eau froide ont été infirmées ;

3° que le parasite peut s'accommoder de milieux défavorables quoique physiquement proches du milieu vaginal,

qu'on peut retenir avec de nombreux auteurs qualifiés l'hypothèse des formes dites à tort « de résistance » dans le cadre strict de l'organisme humain.

3. — LE PROBLEME DES FORMES ENKYSTÉES.

SCHMIDT-HÆNSDORF (17) a mis au point l'historique des travaux consacrés à cette question controversée. Bien que les formes enkystées du trichomonas vaginalis aient été rarement étudiées — les publications s'attachant aux autres espèces —

il semble bien que de nombreuses confusions aient été faites et que l'enveloppe capsulaire caractérisant essentiellement les kystes n'ait jamais pu être mise en évidence. C'est pourquoi les travaux même récents sont si souvent contradictoires. BENSEN (47) a décrit des kystes, les a dessinés ; SCHMIDT & KAMNIKER (48) les ont observés. Ces travaux ont été sévèrement critiqués par LAPIERRE, qui a tranché la question en faisant remarquer qu'il ne saurait y avoir de preuve sans culture.

Seul HOLTZ (1951, 1953) semble avoir observé la membrane caractéristique du kyste mais chez le trichomonas fœtus.

A ces kystes hypothétiques ont fait suite les « pseudo-kystes » suggérés par BLAND & COLLABOR. (49) qui en ont publié des figures en mentionnant la difficulté d'interprétation. SOREL (50) a décrit des « globules basophiles ». MICHALZIK (17) & DYROFF d'Erlangen ont observé des images de multidivision. MICHALZIK suppose que ces modifications pseudo-kystiques pourraient survivre dans des milieux défavorables et a constaté que les mitoses multiples sont plus fréquents quand le milieu s'altère passagèrement, par exemple dans le vagin pendant les menstruations. Il signale avec DYROFF que les images de multidivision qu'ils ont observées ont été considérées à tort comme des formations kystiques par SOODALL (51) & GRIMMER (52). Récemment JIROVEC & PETER ont publié que sur des milliers d'examins ils n'ont jamais observé les images décrites par MICHALZIK.

Toutes ces observations rendent éminemment discutable la possibilité de vrais kystes de trichomonas vaginalis, seule la culture de ces kystes conduisant aux formes habituelles du parasite pouvant être tenue pour preuve de leur existence.

4. — CE QU'ON PEUT PENSER POUR CONCLURE DE LA CONTAMINATION EXTRA-VENERIENNE.

Nous avons exposé ci-dessus pour quelles raisons les animaux domestiques ne peuvent recéler les trichomonas humains et nous les transmettre.

Nous avons résumé ensuite la résistance du flagellé aux facteurs extérieurs. Cette étude nous a enseigné qu'il est très vulnérable au froid, à la chaleur, à une exposition solaire même courte, à l'eau.

Enfin, nous venons de voir ce qu'on peut penser de l'hypothèse des kystes de trichomonas vaginalis, assurant au parasite une survie considérable dans des milieux très défavorables et pourquœi une telle proposition est pratiquement inacceptable.

Il semble bien que malgré l'opinion de certains auteurs autorisés on ne puisse plus tenir pour vraisemblables certaines sources de contamination. Nous rapportons ici G. CHAPPAZ qui écrivait dans sa communication au Symposium de Montréal : « nous sommes prêts à éliminer l'eau partout où on l'accuse : rivières, lacs, canaux, piscines »,

parce que nous savons comment se comporte le trichomonas vaginalis dans ce milieu,

parce qu'il n'y a pas d'auteur qui soit parvenu à ensemençer le flagellé sur des milieux de culture et à isoler des souches testées, quelle que soit la provenance des eaux. L'eau de mer dont la concentration en sels minéraux serait peut-être plus favorable au flagellé ne saurait être retenue comme un foyer de contamination tant il est exceptionnel que les conditions de température optima soient réalisées. Il faudrait en outre prêter au protozoaire, tant dans la mer que dans quelque étendue d'eau tant soit peu considérable, des qualités tactiles bien extravagantes capables de l'amener in situ, ce qui est inconcevable.

On pourrait à cela opposer que les baignoires renferment un faible volume d'eau qui faciliterait la contamination. On admettra cependant volontiers que les milieux sociaux défavorisés usent peu de baignoires quoiqu'ils paraissent selon plusieurs statistiques être les plus infestés ; qu'en outre l'utilisation des savons réduit de façon notable l'agressivité du parasite.

On peut plus facilement soupçonner le bidet mais il faut aussi admettre que son usage mondial est bien restreint.

L'hypothèse de la contamination au cours de la consultation gynécologique pratiquement irrecevable pour des médecins n'intéresse qu'un nombre limité de femmes.

La contamination animale semble impossible comme nous l'avons dit ci-dessus.

Les objets de toilette et les sous-vêtements seraient plus suspects. On ne saurait cependant, après une étude détaillée (KUCERA, JIROVEC), retenir que quelques objets possibles comme l'éponge ou la serviette.

Restent enfin les sièges de cabinets souillés de leucorrhée ou d'urine. Reconnaissons avec G. CHAPPAZ qu'il est peu habituel que la vulve repose sur le siège et que si les fesses emportent quelques flagellés au passage, quel parcours leur restera-t-il à faire ? De plus, la solution des cabinets dits « à la turque »

est infiniment plus répandue dans le monde et la trichomonase est aussi fréquente sinon plus dans les pays où l'usage du siège est absolument ignoré.

En conclusion, on ne peut envisager qu'avec une grande prudence les foyers extra-vénériens de la trichomonase génitale humaine.

Si on veut les admettre, on reconnaîtra que ce mode de contamination « apparaît jusqu'alors comme une conjoncture de probabilités bien nombreuses, trop nombreuses » (G. CHAPPAZ).

III. La Trichomonase uro-génitale est une maladie vénérienne

En 1955, G. CHAPPAZ présentait à l'Académie de Médecine une communication intitulée :

« Note sur la trichomonase génitale humaine ; sa fréquence chez l'homme et la femme et le mode de contamination placeraient actuellement cette infection au premier rang des maladies vénériennes » (53),
dont la conclusion était la suivante :

« On peut affirmer que la trichomonase est une maladie vénérienne. Le nombre des malades qu'elle intéresse, les femmes d'abord, les hommes moins fréquemment, la place, actuellement, après la régression de la gonococcie, au premier rang des maladies vénériennes. »

ALLISON (54) dès 1943 écrivait que la trichomonase de l'homme pouvait être considérée comme la septième maladie vénérienne. Cette thèse était reprise par H. BAUER (55), RAKOFF (56), FREEDL (78), PEREZ & BLANCHARD (2), TRUSSELL (3), DUREL (57) et réunit la quasi-unanimité des spécialistes assemblés au Symposium de Reims. Les rapports et travaux publiés dans le volume du symposium ne paraissent pas avoir laissé de doutes : la contamination habituelle de la trichomonase s'effectue par les contacts sexuels, les cas de contamination extra-vénérienne sont bien ceux qu'on a admis jusque-là « sans preuve ».

Que faut-il prouver pour affirmer que la trichomonase est une maladie vénérienne ?

a) que sa fréquence chez l'homme est élevée,

b) qu'une femme infestée contamine très souvent son partenaire ou inversement,

c) établir la fréquence de l'infestation chez les prostituées,
d) observer l'apparition d'une trichomonase après un coït
infestant,

e) prouver la rareté de la trichomonase chez les enfants
avant la puberté et l'exception chez les vierges.

1. — FREQUENCE DE L'INFESTATION MASCULINE

H. BAUER s'est beaucoup intéressé au problème de la trichomonase chez l'homme et a rassemblé à Monaco et à Reims la plupart des cas publiés à l'époque. « Tout bien considéré — écrit-il — il apparaît qu'elle puisse être aussi fréquente que l'infestation chez la femme ». Mais bien des cas passent inaperçus tant la symptomatologie de l'affection peut être fruste et tant la détection est pratiquement délicate à réaliser chez l'homme. 1/5 des cas serait tout à fait asymptomatique et on ne peut retenir, en tant qu'urétrites non gonococciques, que 2/5 des cas qui se sont révélés par une symptomatologie quelque peu bruyante.

DUREL (57) a rapporté à l'Académie de Médecine que sur 100 urétrites :

30 sont d'origine gonococcique,

10 sont provoquées par le trichomonas vaginalis.

COURTS, sur 2.482 cas d'urétrite non gonococcique, a décelé le trichomonas vaginalis dans 68 % des cas.

Les résultats obtenus chez l'homme sont très variables plus encore que chez la femme ; ils dépendent avant tout des moyens de détection employés et des recherches pratiquées dans les différents milieux : sécrétion uréthrale, urine, liquide prostatique, où se réfugie le flagellé. Ce qui importe le plus, c'est la comparaison entre une statistique concernant les hommes et une statistique concernant les femmes.

On relève dans un tableau présenté par H. BAUER, qui a regroupé les travaux de JIROVEC, WITTINGTON, JAKOWLEWA, FORLINI, VASILLOVA, GOLDBERG, DAVIS & GIRAND, les résultats suivants :

Hommes en série ..	6,8 %	Femmes en série .	6,08 %
		Femmes avec leu-	
Hommes avec U.N.G.	30,2 %	corrhée	50 %
	en moyenne		en moyenne

SENECA & IDES (77) ont relevé dans l'armée américaine :

16 % de trichomonas chez 926 hommes indemnes, ne présentant aucun symptôme,

37 % de résultats positifs au trichomonas vaginalis chez 246 hommes atteints d'urétrite non gonococcique.

C'est devant la persistance d'urétrite, le gonocoque ayant pratiquement disparu avec les antibiotiques, qu'est apparue la fréquence de la trichomonase masculine au cours de ces dernières années et aussi lorsque de nombreux auteurs dont KEUTEL (41), PERJU (17), BEDOYA (58), JIRA (59), WITTINGTON (17), KOSTIC (17), H. BAUER (26), soupçonnant la contamination vénérienne, ont examiné les partenaires de femmes infestées.

« C'est un fait acquis, écrit G. CHAPPAZ au symposium de Montréal, et nous ne pensons pas être contredit ici sur ce point, la trichomonase masculine se présente avec une fréquence comparable à celle de la femme. »

Remarquons par ailleurs que la fréquence chez l'homme est liée, comme chez la femme, à l'âge de l'activité sexuelle.

Nous rapportons ci-dessous quelques tableaux :

Auteurs	Année	Jusqu'à 15 ans	13-20	21-30	31-40	41-50	51-60	60...
TEOCHAROW	1956	0	6,2	21	32,7	28,6	32,4	36,4
WU (Allemag.)	1938	0	Hommes adultes 21 %					

H. BAUER en 1954 (Monaco) indique les résultats suivants établis sur 125 cas de trichomonase masculine :

Age	Nombre	Pourcentage
11-20	5	4 %
21-30	43	34,4 %
31-40	45	36 %
41-50	19	15,2 %
51-60	11	8,8 %
61-70	1	0,8 %
71-80	1	0,8 %

II. BAUER prétend que les formes à symptomatologie bruyante atteignent surtout les hommes jeunes de 20 à 40 ans, les cas « pseudo-latents » augmentant avec l'âge.

JIRA (59) donne en 1958 les précisions ci-après :

Age	Nombre de cas	Pourcentage
15-20	2	1,1
21-25	84	48
26-30	46	26,3
31-35	20	11,4
36-40	11	6,3
41-45	6	3,4
46-50	4	2,4
56-60	1	0,6

Selon BORDO (60) la fréquence maxima se situe entre 31 et 40 ans.

La durée de l'infestation masculine, en dehors de toute thérapeutique, n'est pas encore solutionnée.

Selon BEDOYA (58) les hommes contaminés jeunes, avant le mariage par exemple, pourraient être des porteurs de germes durant toute leur vie. Ce point de vue expliquerait qu'ils puissent infester leur épouse sans rapports extra-conjugaux.

Pour CHAPPAZ (1951) et quelques auteurs, la durée de l'infestation serait limitée, le parasite disparaîtrait spontanément au bout de quelque temps. A l'appui de cette thèse se situe l'opinion de LANCELEY (61) et de H. BAUER (Monaco) : au cours de leur pratique des inoculations expérimentales, la durée de l'infestation qu'ils ont observée n'a jamais excédé quatre mois.

G. CHAPPAZ pense que dans une certaine mesure l'homme peut se comporter en dehors de toute infestation comme un simple vecteur, le parasite pouvant survivre dans la verge, le sac préputial, y trouvant des conditions favorables de température et d'humidité.

Devant l'ambiguïté de cette question, il a soumis au Symposium de Montréal le schéma de protocole que nous reproduisons destiné à éclairer les recherches sur la durée de l'infestation :

a) rechercher dans les prisons, les asiles d'aliénés, où des hommes sont internés depuis longtemps, sans possibilités de coïts, les porteurs de trichomonas, et publier leur temps d'abstinence forcée ;

b) Étudier le temps de survie du trichomonas dans le sillon balano-préputial, soit après un rapport avec une femme infestée, soit après dépôt de culture pure ou impure.

2. — L'INFESTATION RECIPROQUE DES PARTENAIREs.

Nous résumons quelques travaux récents :

BEDOYA, RIOS & RICO (58) ont recherché le trichomonas vaginalis chez 52 hommes dont les partenaires étaient infestées.

Le flagellé a été recherché :

dans la fosse naviculaire,

dans le liquide prostatique après massage rectal,

dans le sperme,

dans le sac préputial,

les prélèvements ont été examinés à l'état frais, colorés, cultivés. Les résultats ont été positifs dans 40 cas (75,5 %). Notons que dans trois des cas, le dernier coït extra-conjugal eut lieu trois ans avant le mariage, c'est-à-dire que le flagellé a pu survivre pendant ce laps de temps et contaminer par la suite les partenaires.

En conclusion, BEDOYA affirme que tôt ou tard lorsque l'un des partenaires est infesté l'autre le devient.

Cette opinion est également partagée par KEUTEL (Reims) et KEUTEL & NEUMANN (41). Ils rapportent les contrôles qu'ils ont pratiqué sur 86 couples. Ils réservent le qualificatif de « douteux » aux formes de souffrance du parasite dont nous avons parlé plus haut. Ce travail peut se résumer comme suit :

1) Cas de Trichomonase du Service de Gynécologie dont les maris sont contrôlés en Urologie :

	maris nettement positifs	maris douteux	Total
44 femmes positives	38,6 %	59,1 %	97,7 %

2) Cas de Trichomonase du Service d'Urologie dont les femmes sont contrôlées en Gynécologie :

	femmes nettement positives	femmes faiblement positives	Total
42 maris positifs	47,7 %	39 %	86,5 %

Rapport de K. KUCERA (Symposium de Reims)
Coexistence de Trichomonas vaginalis
chez des partenaires sexuels

Auteurs	Année	Pays	Nombre examiné	% de coexistence
<i>a) Hommes en rapport avec des femmes abritant du T. V.</i>				
WALTHER	1953	Allemagne	100	25
KEUTEL & NEUMANN ..	1955	»	86	97
WITTINGTON	1951	Angleterre	26	26
SOREL	1952	France	7	100
COUTTS & COLL	1955	Chili	—	40
NAZZARO & PASCARELLA	1953	Italie	100	7
SENDA	1955	Japon	30	20
KOZLOWSKI	1954	Pologne	100	25
KUCERA	1950	Tchéco-	4	100
JIRA	1956	Slovaquie	31	32,2
STEIN & COPE	1933	U.S.A.	3	33
ADAIR & HESSELSTINE .	1936	»	7	42
DRUMMOND	1936	»	5	80
PATTYSON	1937	»	25	24
KARNAKY	1938	»	38	100
HILLMAN	1951	»	150	25
GUTTMACHER & PERL ..	1955	»	20	100
KOSTIC	1954	Yougoslav.	48	34
SANTOS & ZAGURY		Brésil	21	52
(cite BAUER, 1943)				

Auteurs	Année	Pays	Nombre examiné	% de coexistence
<i>b) Femmes en rapport avec des hommes souffrant de trichomonase</i>				
KOZLOWSKI	1951	Pologne	5	100
KOZLOWSKI	1954	»	33	100
JIRA	1956	Tchéco-slovaquie	28	89,3

Travail de Gisella PERL et collab. (10)

Dans un premier temps G. PERL recherche le flagellé dans l'urine fraîche, centrifugée et cultivée d'hommes dont les femmes sont positives. Sur 36 examens, un seul fut positif (2,7 %).

Dans un deuxième temps la recherche est pratiquée sur le sperme obtenu par masturbation.

48 cultures donnèrent 28 résultats positifs, soit un pourcentage de 58 %.

Ce travail illustre bien que les moyens techniques conditionnent le pourcentage des résultats positifs. H. BAUER reprenant les travaux de nombreux auteurs, ajoutés à ses notes personnelles, a rapporté au Symposium de Reims une statistique portant sur 1.196 hommes dont les femmes étaient positives.

263 ont été reconnus comme nettement infestés soit 21,9 % ; ce pourcentage est voisin de celui indiqué plus haut par WU.

Mais l'auteur écrit : « on constate, sans doute avec les progrès de la technique que lorsque les femmes sont infestées le nombre des partenaires atteints est de plus en plus croissant. En se rappelant les considérations relatives aux difficultés de diagnostic chez l'homme et la durée de l'infestation chez lui, on peut accorder un certain crédit à l'affirmation selon laquelle, il y aurait eu jusqu'à présent trop peu de recherches exactes réalisées, en particulier, par la culture chez les hommes dont les partenaires étaient positives ».

Alex PERJU (Symposium de Reims) a trouvé 48 % de cas positifs chez les partenaires de femmes infestées, répartis comme suit :

sac préputial : 2 %,
urètre antérieur : 8 %,
urètre postérieur : 16 %,
prostate : 22 %.

Tous ces travaux, que nous venons de résumer, suffisent à démontrer la fréquence de l'infestation simultanée des deux partenaires.

Les pourcentages publiés des atteintes réciproques croissent chaque année d'autant plus que la rigueur des techniques employées, aussi bien chez l'homme que chez la femme a pu être appliquée pour l'argumentation que nous exposons ici. Bien sûr une telle méthode paraît d'application difficile aux examens de routine et nous ne serons jamais à l'abri de la récurrence.

Concluons enfin avec BEDOYA et CHAPPAZ qui sont persuadés que lorsque le commerce sexuel a été suffisamment long entre deux partenaires, dont l'un est infesté, l'autre le devient presque fatalement.

3. — L'INFESTATION CHEZ LES PROSTITUEES.

Ottolenghi PRETI a rapporté au Symposium de Reims les résultats qu'il a obtenus chez 120 prostituées de maisons closes.

La recherche du flagellé a été faite à l'état frais, les prélèvements effectués dans le cul-de-sac postérieur, les glandes de Skène, le col.

14 femmes étaient positives, soit 11,6 %, dont :

6 cas seulement dans le vagin,

4 cas dans les glandes de Skène seulement,

3 cas dans les glandes de Skène et le vagin,

1 cas dans l'urètre seulement.

O. PERRI reconnaît que ce pourcentage est faible. Il note cependant que le fait d'avoir trouvé le flagellé 9 fois dans le vagin et 5 fois sans participation vaginale est paradoxal.

Cela peut confirmer, écrit CHAPPAZ au Symposium de Montréal, une hypothèse déjà citée par d'autres auteurs : les irrigations vaginales avec ou sans savon, avec parfois des antiseptiques sont répétées un grand nombre de fois par jour par ces femmes et épargnent ces dernières dans le vagin.

Mario CARDIA a publié au Symposium de Reims les résultats obtenus après l'examen de 267 prostituées, examinées au Dispensaire d'Hygiène Sociale de Porto. En 1955, 127 cas de Trichomonase ont été relevés, soit 47,6 %.

BEDOYA au Symposium de Reims rapporte 25 % de cas positifs chez 228 prostituées examinées. Soupçonnant ces femmes de pratiquer une minutieuse toilette vaginale avant les contrôles, il réussit à examiner 30 de ces femmes chez lesquelles l'examen avait été négatif. Il pratique alors un prélèvement urétral uniquement quand le vagin est négatif. Sur ces 30 femmes examinées une seconde fois, 9 d'entre elles ont été positives dans le vagin, 13 dans l'urètre, soit un pourcentage total de 73,3 %.

Travail de P. DUREL et Vera VOIRON (Symposium de Reims)

Chez les prostituées examinées à l'Institut Fournier les auteurs ont établi la répartition suivante :

Chez 100 femmes infestées :

urètre et vagin sont positifs dans 68 % des cas,

l'urètre seul est positif dans 8 % des cas,

le vagin seul est positif dans 24 % des cas.

Le taux de l'atteinte urétrale est donc de 76 %. Ce résultat confirme la nécessité d'explorer l'urètre.

SIBOULET (62) écrit : « Pendant longtemps, on a pensé que le trichomonas vaginalis était l'hôte de la seule femme honnête et qu'il était pratiquement inconnu chez la prostituée, habituée à une soigneuse hygiène locale et aux injections anticonceptionnelles. En réalité, la recherche systématique non seulement au

niveau du vagin, mais aussi dans l'urètre et les glandes de Skène précise la fréquence de l'infestation à trichomonas vaginalis quelles que soient les saisons. »

SIBOULET a interrogé 114 de ses malades sur les modes probables de leur infestation. Il les résume ainsi :

Rapports conjugaux : 31

Rapports extra-conjugaux : 64

Homosexuels : 11

Non précisés : 8.

Lee Buxton et Collab. (16) ont examiné un groupe de détenues probablement prostituées et ont trouvé 70 % d'infestation, pourcentage élevé bien qu'ils n'aient pas examiné les voies urinaires. G. CHAPPAZ explique ce pourcentage par le fait que les femmes étaient vraisemblablement infestées avant leur détention et qu'elles n'avaient plus de raisons ni autant de facilités pour pratiquer des ablutions intimes.

Rapportons enfin le travail de M^{lle} PESTRE (63) qui écrit :

a) « Il est un point important et riche de déductions pathologiques et thérapeutiques, sur lequel nous voudrions maintenant insister. Il s'agit des conditions locales liées à l'hygiène génitale.

« Toutes nos malades appartenaient à une classe sociale et à des groupements ethniques où nous ne pensons pas que les pratiques élémentaires d'hygiène aient été respectées. En tout cas, si ces pratiques existaient, elles étaient insuffisantes. Nous en avons, croyons-nous, une preuve par la comparaison qu'il nous a été donné de faire entre la fréquence du trichomonas vaginalis chez les femmes examinées à la consultation de gynécologie et chez les prostituées contrôlées par le Centre municipal de salubrité.

« Sur près de 150 de ces dernières, nous n'avons retrouvé que deux cas de parasitose. Encore s'agissait-il de « clandestines » amenées au Centre par la police. Chez toutes les autres « filles de maison », non seulement nos recherches ont été absolument négatives, mais encore nous avons eu la surprise de constater l'état paradoxalement sain de la muqueuse vaginale. Les parois étaient lisses, propres, sèches. Il semblait que les tissus avaient perdu le caractère particulier d'une muqueuse.

« Nous savons, certes, que toutes ces femmes procèdent, avant l'examen bi-hebdomadaire, à des ablutions minutieuses avec des produits divers, astringents souvent. Mais il est certain que chez ces femmes la fréquence inusitée des lavages, des injections et de l'emploi de produits antiseptiques locaux

joue un rôle important dans cette sorte de résistance à une parasitose commune chez toutes les autres.

« Il semble que les recherches chez les prostituées n'aient pas été fréquentes. KISSLING (64) paraît confirmer notre opinion.

« Nous avons aussi retrouvé un travail de GREENBLATT (65) dont les conclusions portant sur un nombre de femmes sensiblement égal au nôtre étaient pourtant diamétralement opposées à notre conclusion.

« Encore faut-il noter que cet auteur anglo-saxon effectue ses recherches dans un pays où la prostitution n'est ni tolérée, ni soumise à une réglementation sanitaire telle qu'elle existe en Afrique du Nord.

« Dans le même ordre d'idées, nous relevons les chiffres très précis fournis par WESSELS (66) en 1943 et qui montrent que les femmes qui pratiquent habituellement des injections de liquides anticonceptionnels sont très rarement infestées par le *Trichomonas*.

« b) Il est enfin d'autres conditions essentielles à l'infestation par le flagellé, à la persistance de la parasitose ou à sa résistance aux thérapeutiques ; celles-là sont plus précisément liées au mode de contagé. Nous les envisagerons ultérieurement dans la mesure où elles expliquent la difficulté du traitement. »

Malheureusement, M^{lle} PESTRE n'a pas examiné le tractus urinaire de ses femmes, mais en 1953, alors que le mode de contamination vénérien de la trichomonase était peu connu, elle remarquait que ses résultats chez les prostituées étaient paradoxaux.

Nous ne ferons, pour finir, que citer les résultats de quelques auteurs :

CANDIANI a trouvé 32 % des prostituées positives (6), SAMPAIO & CHAVEZ (67) 39,5 %, BREINDL 90 %.

KUCERA a établi au Symposium de Reims le tableau suivant :

Auteurs	Année	Pays	Catégorie	Nbre ex.	%
a) <i>Prostituées réglementées</i>					
BEUTER	1940	Allemagne		—	33
MANDOUL & PESTRE	1953	France		150	1.3
CANDIANI	1953	Italie		150	32
SAMPAIO & CHAVEZ	1905	Portugal		233	39,5

Auteurs	Année	Pays	Catégorie	Nbre ex	%
b) <i>Prostituées sans réglementation</i>					
BREINDL	1917-18	Albanie		—	60-90
GREENBLATT	1942	U.S.A. (Géorgie)		378 127	51 66
UENO, HOSOYA, JI- JIMA, AMADA (ci- te BAUER)	1954	Japon		863	46,3
DOS SANTOS & ZA- GURY (cite CHAP- PAZ 1951)	1943	Brésil	Proxénètes	—	54,8
PETER	1945	Tchécosl.	Fillles publiques non contrôlées	93	51,5
KUCERA	1950	Tchécosl. tziganes	vagabondes	25	80
c) <i>Femmes de vénérologie (consultation spéciale)</i>					
LISTON & LISTON . Kuitunen EKBAUM & Mc DONALD ..	1939 1942	U.S.A. Canada		134 70	73,4 58
ROUHUNKOSKI ...	1948	Finlande		296	50,6
KOZLOWSKI	1951	Pologne		—	56
d) <i>Métiers divers</i>					
NAKARA & RECH- NITZ	1938	Hongrie	serveuses domestiques couturières manucures de Budapest	117	59
e) <i>Femmes socialement misérables</i>					
CROWN	1933	U.S.A.		100	50
BUXTON & .SHE- LANSKI	1937	»		106	48,1
ANDREWS	1938	»		—	50
KARNAK	1940	»		—	46,3
CORBIT, Mc ELROY & CLERK	1941	»		1883	47,7
FEO	1953			500	43,6
LAMBILLON, KAN- GI & PETEPETE	1954	Congo Belge	Afr. de Léopoldville id. gravides Afr. de Ipa Kasai Afr. de Ruanda id. gravides	1340	37,5 46,5 31,3 44 54

Remarquons que dans ce tableau les pourcentages les moins élevés se situent chez les prostituées réglementées, probablement pour les raisons avancées par M^{re} PESTRE.

Il apparaît, en conclusion, que l'infestation chez les prostituées est très fréquente. Cette fréquence augmente avec la minutie des techniques surtout si on y ajoute la recherche systématique dans les voies urinaires.

On se range alors volontiers à l'avis de BEDOYA qui estime que toutes les prostituées non traitées sont contaminées ce qui laisse à penser que si ces femmes infestent quelques hommes par jour, lesquels se comportent à leur tour comme des porteurs de germes, la Trichomonase trouve son extension dans ce mode de propagation.

4. — *PRECISIONS SUR LE COÛT DE CONTAMINATION.*

Il est difficile de déterminer que l'infestation d'un partenaire jusque là indemne a été transmise par un coût de contamination ; s'il est possible, après un certain délai d'incubation, de déceler cette infestation, un argument de poids sera apporté en faveur de la théorie qui affirme que la trichomonase est une maladie vénérienne. Mais il faut convenir que cette flagrante infestation est d'une constatation bien peu aisée.

Les inoculations expérimentales fournissent de précieux renseignements sur la durée d'incubation de la maladie :

LANCELEY & Mc ENTÉGARD (68) estiment que c'est 6 à 9 jours après inoculation à l'homme d'une culture pure que l'on retrouve le parasite dans les urines et le liquide prostatique.

POIZNER & KOULAKOVA (69) rappellent les travaux :

de RODECURT : 4 jours après avoir inoculé une femme saine, il observe l'apparition d'abondantes sécrétions, et une colpïte nette le 11^e jour ;

de TRUSSEL & PLASS qui notent l'apparition d'un processus inflammatoire 4 à 7 jours après avoir inoculé le vagin de femmes enceintes. Ils estiment que la durée de la période d'incubation est de 4 à 7 jours.

En dehors de l'expérimentation, la documentation concernant la durée d'incubation est peu abondante.

JIRA (59) situe le délai qui sépare un coût infestant des manifestations aiguës de la maladie au stade de primo-infection à une semaine environ. Mais écrit CHAPPAZ (Symposium de Montréal) dans les cas que les auteurs tchèques désignent sous le terme de primo-infection sous chronique, la trichomonase commence lentement et n'a pas une incubation limitée.

La durée d'incubation chez l'homme a été déterminée dans 57 cas selon le tableau ci-dessous :

Incubation	Nombre de cas	%
1 à 5 jours	41	49,3
6 à 10 jours	23	40,4
11 à 15 jours	11	49,3
1 à 3 mois	5	8,8
3 à 6 mois	1	1,7
Total	57	100,00

C'est là un document d'une valeur considérable dont on peut tirer les conséquences.

Pour PETER & JIROVEC (70) le stade I de début chez la femme suivrait également de quelques jours le coït contaminant.

KING & MASCALL ont établi que l'infestation ne survenait que 3 à 10 jours après le rapport sexuel (71).

En conclusion, on peut admettre que la preuve du coït de contamination est faite et que l'infestation survient après une période d'incubation de 5 à 15 jours correspondant au délai des inoculations expérimentales. Ce délai est beaucoup plus précis à définir chez l'homme, d'une part, parce qu'on ne peut comparer le milieu vaginal au milieu urinaire et, d'autre part, parce qu'on sait que certaines femmes sont peu réceptives, d'autres, dans certains cas, pas du tout.

Dans une monographie très importante publiée en 1959, (79) JIROVEC, PETER & JIRA exposent les motifs qui leur permettent d'affirmer que la trichomonase humaine ne se répand que par la contamination vénérienne. Ils rappellent leurs travaux sur la faible résistance du flagellé dans les conditions extérieures à l'organisme, et indiquent la durée d'incubation chez l'homme, qu'ils situent de 1 à 14 jours.

5. — LA TRICHOMONASE DES ENFANTS ET DES VIERGES.

Cette question est encore très controversée. Elle a été reprise souvent par les auteurs qui minimisent le fait de la contamination habituelle par le mode vénérien.

R. PETER (72) dans le service de gynécologie infantile de Prague différencie les fillettes en oestrogénisées et non oestrogénisées, ceci surtout à cause de la trichomonase.

Il distingue : l'époque du nouveau-né encore sous l'influence des hormones maternelles.

l'époque de la quiétude génitale sans influence hormonale.

l'époque prépubertaire et pubertaire déjà sous l'influence des hormones sexuelles ovariennes.

RODECURT déclarant que le trichomonas vaginalis pouvait se rencontrer chez la fillette, PETER & JIROVEC entreprirent la recherche du flagellé en vain, écrit PETER, même dans les cas de leucorrhée et de colpité intenses.

En cinq ans, ils n'ont décelé aucun cas de trichomonase chez les enfants de 1 à 10 ans, époque de la quiétude génitale.

— à la période néo-natale ils en ont observé deux cas.

— ce n'est qu'à la troisième période gynécologique de l'enfance qu'ils ont décelé quelques cas positifs.

Si l'on peut admettre à coup sûr que les deux cas rapportés chez les nouveau-nés sont dus à une contamination au passage au cours de l'accouchement on est bien obligé d'admettre que les fillettes de 1 à 10 ans n'ont jamais pu être contaminées.

PETER analyse ensuite minutieusement chacune de ses observations : pour les deux nourrissons.

Une fillette de 5 mois, le trichomonas avait été découvert déjà à deux mois, la mère était très positive.

Une fillette de 3 mois était déjà infestée le 7^e jour, la mère était positive.

Pour PETER, il n'y a pas de doute possible, la contamination de passage a persisté plusieurs mois.

PETER et ses collaborateurs disposaient, en 1954, de 11.500 observations ; en septembre 1958, ils en possédaient plus de 15.000.

Dans toutes ces observations, ils n'ont décelé que 109 cas positifs, soit 0,98 %, entre 0 et 14 ans, répartis comme suit :

	Age	Nombre de cas	°/∞
Epoque hormonale du nouveau-né	0-1 an	13	1.0
Epoque de la quiétude génitale	2	0	0
	3	0	0
	4	1	0.08
	5	2	0.16
	6	1	0.08
	7	1	0.08
	8	0	0
Epoque prépubérale et pubérale	9	4	0.32
	10	7	0.56
	11	9	0.71
	12	16	1.40
	13	25	2.10
	14	30	3.00

En résumé, en dehors de la période probable de contamination de passage pendant l'accouchement et de l'âge suspect des attouchements homo-sexuels ou digitaux prolongés au-delà de 11 ans, d'approches masculines sans défloration, il ne reste que 5 cas entre 2 et 8 ans qui sont positifs sur 11.500 examens.

Nous abandonnerions, écrit G. CHAPPAZ, ces 5 cas *presque* sans réserve à la contamination extra-sexuelle. Pour les 91 autres, nous sommes pleins de réticences, une longue expérience de gynécologue nous a enseigné que bon nombre d'hommes pervers ou déficients mentaux se livrent plus facilement qu'on ne l'admet, même dans leur propre famille, à des jeux d'approche sur des fillettes dès l'apparition de leurs moindres caractères sexuels secondaires, comme ils se livrent à des coïts complets sur des « faibles d'esprit » adultes, paralysées ou non, mais qui n'ont pas de possibilité réelle de choisir le non consentement.

PETER, dans sa première série d'observations, a examiné 14 mères de fillettes infestées, 5 seulement étaient positives, dont celles des 2 nourrissons. Parmi les 9 mères qui étaient négatives, 6 avaient des filles de 14 à 19 ans. Il est bien évident que dans ces cas on ne peut retenir la contamination familiale. Que reste-t-il pour ces 6 filles comme étiologie extra-sexuelle ? Nous avons vu, par ailleurs, ce qu'il faut penser des bains de rivière et des bains publics.

En conclusion, les travaux de PETER, JIROVEC et ses collaborateurs infirment la notion encore trop classique de l'infestation à *Trichomonas vaginalis* chez l'enfant ; ces travaux émanent de minutieux examens auxquels on peut accorder le crédit le plus absolu.

PETER soutient que pendant la période de carence hormonale totale la fillette ne peut pas abriter le parasite. Cette thèse élimine tout mode de contamination possible vénérien ou autre. On a vu, par ailleurs, que dans l'époque prépubertaire le pourcentage qu'il a trouvé est encore très faible.

Si l'on n'admet pas, comme PETER & CHAPPAZ, que la carence totale en oestrogènes ne s'oppose pratiquement pas à l'infestation chez la fillette comme chez la femme — les modes de contamination extra-vénérienne étant identiques pour l'une comme pour l'autre — il faut alors affirmer que la fillette de 1 à 10 ans resterait indemne parce que sans approche sexuelle. C'est — écrit G. CHAPPAZ — affirmer la seule possibilité de la contamination par le mode vénérien.

PETER a été un des premiers auteurs à signaler la possibilité de l'infestation à *trichomonas* chez les adultes vierges ; mais la fréquence du *trichomonas* chez ces adultes est très faible.

Cet argument, écrit-il, n'infirme en rien la théorie du mode vénérien de contamination, car « de nombreuses vierges infestées par le trichomonas vaginalis se soustraient par leurs mensonges et leurs dissimulations au jugement épidémiologique du médecin ». Il rapporte les confidences qu'il a recueillies sur les « jeux sexuels cachés ». Il a pu « rencontrer le trichomonas sur la peau, sur une grande largeur autour des parties génitales, sur le pubis, dans les plis génitaux fémoraux, sur les parties internes des cuisses ». Il ne faut pas oublier non plus, écrit PETER, les pratiques homo-sexuelles.

D'autres auteurs ce sont intéressés à la trichomonase infantile :

TRUSSEL et collabor. ont rapporté des cas de trichomonase néo-natale « au passage ».

LEE BUXTON (16) a examiné 147 jeunes filles vierges de 20 à 22 ans et n'a pas découvert un seul cas de trichomonase.

SIBOULET (62) écrit que lorsqu'on interroge des vierges infestées, l'interrogatoire montrerait que dans plus de 80 % des cas elles aient eu l'expérience de coït ante portas.

KATSUNUMA (73) a publié un cas de trichomonase chez un garçon de trois ans.

KEUTEL (44) signale que STRAIN (74), ASAVSKIJ (75), COUTTS (76) en ont découvert chez de jeunes garçons.

SIBOULET, au Symposium de Reims, en a rapporté un cas chez un garçon de 9 ans.

En résumé, ces observations constateraient que l'infestation chez les petits garçons est encore beaucoup plus rare que chez les petites filles.

Reste comme dernier argument encore employé les cas de trichomonase qu'on aurait pu déceler chez des religieuses. Bien que nous ne disposions pas de documents sur cette question, il serait bon de pouvoir préciser à quel âge a eu lieu l'entrée dans les ordres. Notre connaissance de la durée de la trichomonase féminine non traitée est bien imprécise plus encore que chez l'homme.

G. CHIAPPAZ rapporte qu'il a traité il y a quelque temps une femme de 78 ans dont le mari est décédé il y a 48 ans ; on peut être certain dans ce cas particulier que cette brave femme n'a pas approché d'autre homme que son époux. Elle présentait une leucorrhée sanguinolente, de fait néoplasique où le flagellé fourmillait. Selon toute vraisemblance — écrit-il — elle est parasitée depuis près d'un demi-siècle, et si elle était entrée dans les ordres à 30 ans, il n'en serait pas autrement !

CONCLUSIONS

I. — Il semble bien que les sources de contamination extra-sexuelles que nous avons examinées n'ont pas fait leurs preuves biologiques ; une analyse logique les fait admettre comme exceptionnelles.

II. — Les recherches récentes qui s'aident de techniques rigoureuses ont précisé que la Trichomonase masculine est aussi fréquente que la Trichomonase féminine.

III. — Les partenaires d'un couple s'infestent réciproquement dans la grande majorité des cas.

IV. — Chez les prostituées, si la détection est pratiquée à la fois sur les voies urinaires et les voies génitales, les résultats montrent que ces femmes sont en principe parasitées par le *Trichomonas vaginalis* à condition que l'examen soit pratiqué loin de tout lavage vaginal.

V. — La durée d'incubation chez l'homme après un coït de contamination a pu être déterminée. Elle serait de 7 à 14 jours.

VI. — Les enfants avant la puberté, garçons ou filles, ne sont pratiquement jamais infestés par *Trichomonas vaginalis*.

VII. — Les cas exceptionnels de Trichomonase chez les vierges sont expliqués le plus souvent par les tentatives de coït ante portas ou par les pratiques homo-sexuelles.

VIII. — La Trichomonase uro-génitale est en conclusion une maladie vénérienne, et la plus répandue de toutes actuellement.

Vu :

*Le Doyen de la Faculté
de Médecine de Paris :*

Professeur L. BINET.

Vu :

Le Président de Thèse :

Professeur R. MERGER.

Vu et permis d'imprimer.

Le Recteur de l'Académie de Paris :

J. SARRAILH.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- 1 HEHNE Zbl. g. Gyn. 1916, 40. 4-15, pp. 113-13
- 2 PEREZ et BLANCHARD Trichomoniasis vaginal - Libr. y Editorial « El Alteneo » Buenos-Aires, 1944 - 175 p.
- 3 TRUSSELL J. Iowa Med. Soc. 1940, 30-66, Proc. Soc. Express. Biol. a. Med. 1941, 47, 176 J. Infect. Dis. 1941, 69, 18, Ann. J. Obst. Gyn., 1942, 44, 292. J. Parasit., 1946, 32, 573. Trichomonas vaginalis and trichomoniasis Thomas, Springfield-Illinois, 1947, 277 p.
- 4 CHAPPAZ et CHATELLIER .. Vaginites et Trichomonas - G. Doin - Edit. Paris 1951, 134 p.
- 5 HARKNESS Non gonococcal urêthritis - E. et S. Livingstone Ltd Edimburgh - 1950, 424 pages.
- 6 CANDIANI La Trichomoniasi vaginale - Edit. Scient. Salpietra Florence, 1953. 172 p.
- 7 SYMPOSIUM DE MONACO « Les Urétrites non gonococciques » - Masson Edit. Paris 1957, et Presse Médicale 1955, 63, N° 70, pp. 1435-37.
- 8 SYMPOSIUM SUR LA TRICHOMONASE International Record of Medicine and General Practic Clinics., September and November 1955, Vol. 163, N° 9, and N° 11, pp. 551-565 ; 709-730.
- 9 C. CUCKLER - A.B. KUPFERBERG and N. MILLMAN Antibiot. a. Chemotherapy. 1955, 10 January, Vol. X.
- 10 Gisella PERL - ALAN - GUTRACHER - RAGGAZONI . Male a Female. Trichomoniasis - Obst. a Gyn. 1956, Vol 7, N° 2 Feb.
- 11 G. ROGERS - G. BELLOFF - MARY PAUL - YURCHEMO - GEVER Antibiot. a Chemoth., 1956, Vol VI, mars, N° 3.
- 12 J. LYNCH - E.C. HOLLEY - J. MARGISON Antibiot. a Chemoth., 1955, Vol. IX, N° 9, Septembre.

- 13 A. PLENTI-MARY J. GRAY-
EARL NELSEN Clinical Evolution of 2, acetylamino 5
nitro thiazale an orally effective tri-
chomonacide Ann. J. Obst. a. Gynec.,
1956, January.
- 14 KEAN - J. WELD Transmission of T.V. in the eye of
animals Proc. of the Soc. f. expe-
rim. Biol. a. Med. 1955, N° 89, pp.
218-219.
- 15 FEO a. collabor. Brit. J. of Venereal Diseases 1956, Vol.
XXXII, N° 4 déc. The Bacteria assoc.
with T.V. in male urethr. J. Urol.,
1956, 75 pp. 711-716. Ann. J. Trop.
Med., 1944, 24. 195.
- 16 Lee BUXTON Obst. and Gyn. 1958, Vol. 12, N° 6,
Décembre.
- 17 SYMPOSIUM INTERNA-
TIONAL DE REIMS in « Les Infestations à Trichomonas »
Maison Edit. Paris, 1957, 381 pages.
Discussions in C.R. Sté Fr. de Gyn.,
1957, Nos 7, 8, 9,
1958, Nos 1, 2, 3, 4.
Expansion Scient. Fr. Edit. Paris (6°),
15, rue St-Benoit.
- 18 HEES Klin. Wochensch, 1935, 14, 240
Klin. Wochensch, 1935, 44, 1937
J. Egypt. M.A., 1938, 21, 813
- 19 RODECURT Ztbl. f. Gyn., 1936, 60, 567
- 20 DOS SANTOS et ZAGURY .. Trich. Vag. Tratam.
An. Bras. di. Gynec., 1943, 16, 167
- 21 KARNAKY Treatm. of T.V.
Am. J. of Surgery, 1940, 48, 216
Trich. A Twel Year Study West Journ.
of Surgery, Obst. Gyn, 1946, 54 61-64
Ann. J. Obst. a. Gyn., 61, 229-30, 1951
- 22 ROTH J. of Vener. Dis. Inform. 1944, 25,
163-166
- 23 WESTPHAL Zentrbl. f. Bakter, 1936, Abt I, 137,
363-76
- 24 STABLER - FEO - RAKOFF . Implant of intestinal T. into the human
vagin Ann. J. Hyg. 1941, 42, 276
1943, 45, 529
- 25 BONFESTEL Inocul. experim. with. T. humains,
buccalis and vaginalis J. of Parasit.
1936, 22. 511
- 26 BAUER Zeitschr. f. Urol. 45, 1952, Haft 5, 224
Zentrbl f. Gyn. 74, 1952, Haft 7, 246
- 27 DOBELL Parasitology - 1934, 26, 531
1939, 31, 178
1942, 34, 101
1943, 35, 134
- 28 ALLEN Ann. J. Obst. Gyn. 1935, 30, 565
Ann. J. Surgeon, 1936, 33, 523
Ann. J. Obst. 1943, 45, 246
Ann. J. Obst. Gyn. 1946, 51, 387
- 29 SEMIC Aspects différentiels du Trichomonas -
Volume du Symposium de Reims, pp.
233-36
- 30 RODECURT Dtsche Med. Woehensch, 1933, 45, 546
Zentrbl. f. Gyn., 1936, 60, 567

- 31 STEIN et COPPE Ann. J. Obst. Gyn., 1931, 22, 368
Ann. J. Obst. Gyn., 1933, 25, 819
- 32 DEBIASI Ann. Ost. Gin, 1939, 61, 281
- 33 Mac CULLAGH Discussion au Symposium de Reims
in C.R. Sté. Fr. Gyn. - 1958, N° 1, p.
50
- 34 RIFF Le T.V. agent pathogène. Gyn. et Obst.,
1934, 274
- 35 LOIZAGA Boll. Inst. Clin. Quir. Buenos-Aires,
1928, 4, 295
- 36 ACKERMANN Derm. Zbl., 1935, 71, 132
- 37 BYKHOWSKY et GOJ-
CHANSKY Ann. Mal. Vener., 1935, 30, 92
- 38 WEILLER Z. Hyn. Infektionskr., 1938, 121, 27
- 39 WU YUNG Zbl. Bakt. 1938, 141, 411
- 40 MORGAN J. Parasit. Suppl., 1941, 27, 16
ibid 1949, 31, 8
Bovine Trichomoniasis, Edit. Burgess,
Minneapolis, 1944
- 41 HEGNER et RATCLIFFE J. Parasit., 1937, 23, 225
- 42 DEPORTER C.R. Sté. Fr. Gyn. 1958, 28, N° 1, p.
53.
- 43 WILLE Med. Klin., 1918, 1, 520
- 44 KEUTEL Zbl. f. Bakt. Parasitenk. Infektionskr.
u. Hygiene 1958, 1 Orig., 172, 310-29
Ztbl. f. Gyn. 1955, 34, 1352
Bertrag zum Krankheitsbild der Tri-
chomonas der Menschen Zentrbl. g.
Gyn 1955, Heft 34, 1352-62
- KEUTEL et NEUMANN
- 45 KESSEL et THOMSON - WIL-
SAR Proc. Soc. Exper. Biol. a. Med. 1950,
74, 755
- 46 KESSEL et THOMSON Southwest Med. J., 1938, 22, 133-35
- 47 BENSEN Arch. Schiffs a. Tropen hyg. 1908, 12,
661
- 48 SCHMIDT et KAMNIKER Arch. f. Gyn, 1926, 127, 362
- 49 BLAND et collabor. Ann. J. Obstr. Gyn. 1936, 32, 835
J.A.M.A., 1940, 115, 1013
- 50 SOREL J. Urologie, 1952, 58, 109-17
- 51 GOODAL J. of. Obstr. a. Gyn. Brit Emp. 1938,
45, 597-603
- 52 GRIMMER Zeitschr. f. Hauf. u. Gesskleir 1949,
7, 1-3
- 53 CHAPPAZ Bull. Acad. Nation. de Méd., 1955, 1
et 2, 45
- 54 ALLISON South Amer. J. Med. 1943, 36, 823
- 55 BAUER Dermat. Wschr., 1942, 115, 49
Dermat. Wschr., 1957, 136, 37
Rapport Sté de Dermatologie - Er-
langen 28 Juin 1957
- 56 RAKOFF Ann. J. of Obst. and Gyn., 1947, 42,
276-80
- 57 DUREL Prophyl. Sanit. et Soc. 1954, 26, mars,
48-65
Gynec. Prat., 1957, N° 6
B. Acad. Med., 1954, 3 et 4, 65
Symposium de Reims

- 58 BEDOYA Gynec. Prat. 1957, N° 6, 413-22
 BEDOYA - RIOS - RICO Chez les partenaires
 Geburtsh. u. Frauenheilk. 1958, H.8, p. 890
 Chez les Prostituées, ibid. » p. 994
 Dans l'urètre humain, ibid. » p. 997
- 59 JIRA Ztbl. f. Bakt. - Parasit - Infekthr. und
 Hygiene 1958, 1. Orig. 172 - pp. 310-329
- 60 BORDO West. Vener. dermat., 1957, 3, 54
- 61 LANCELEY Brit. J. Vener. Dis., 1953, 29, 213-217
- 62 SIBOULET J. de Med. et Chir. Prat. 1959, avril.
 Cahier 9, pp. 399-403
- 63 PESTRE Thèse Alger 1953, sous l'autorité du
 Pr. Mandoul
- 64 KISSLING Gyn. et Obst., 1934, 29, 116
- 65 GREENBLATT West. J. Surg., 1945 53, 115
- 66 WESSELS Cit. par Trussell
- 67 SAMPAIO Trach. Soc. port. Derm. Vener. 1955,
 13, 255
- 68 LANCELEY et Mc ENTERTON Lancet. 1953, 284, 663
- 69 POIZNER et KOULAKOWA Edit. à Tomsk. 1952
 Trad. Centre Econ. et Cult. France-
 U.R.S.S., 22, rue d'Anjou, Paris
- 70 PETER et JIROVEC Promethens Verlag, Prague, 1945,
 135 p., tiré à part
 Prophylaxe, 1954, 1, 102-285
- 71 KING et MARSHALL Cit. Poizner
- 72 PETER Symposium de Reims
 Gynec. pratique, 1957, 6, 431-44
 Promethens Verlag - Prague, 1945,
 136 p. (en langue tchèque)
- 73 KATSUNUMA B. Soc. Path. Exot., 1924, 17, 216
- 74 STRAIN J. Urology. 1945, 54, 483
- 75 ASAVSKIJ und SAMMIA ... Urologija, 1955, 13, 255
- 76 COUTTS E. SILVA Acta Venerol, 1952, 32, 228
 COUTTS - VARGAS - ZALAZAR Brit. J. of Vener. Dis. 1948, 24, 109-20
 Rev. Chilena urol. 1952, 15, 3-48
 Brit. J. Vener. Dis 1952, 28, 2-97
 Brit. Med. J. 1955, 2, 885
 Urol. und Cut. Rew 1951, 55, 143-59
- 77 SENECA et IDES Ann. J. Trop. Med., 1953, 2, 1948
- 78 FREEDL South. Afric. Med. J., 1948, 22, N° 6,
 223-6
- 79 JIROVEC - PETER - JIRA .. J. of Hyg. Epidem. Microb. a Jmmun.
 1959, III - 195 pp. 195 à 219

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	19
CHAPITRE I. — NOTIONS D'ÉPIDÉMIOLOGIE	21
a) Répartition géographique	21
b) Fréquence selon les saisons	27
c) Fréquence selon les races	28
d) Fréquence selon les milieux sociaux	29
CHAPITRE II. — LA CONTAMINATION	30
I. — L'auto-contamination d'origine digestive	30
1° La différence de fréquence entre la trichomonase digestive et la trichomonase uro-génitale	30
2° Les inoculations expérimentales	32
3° Recherches de protistologie	33
II. — La contamination extra-sexuelle	35
1° Les divers foyers de contamination	35
2° La résistance du trichomonas vaginalis aux facteurs extérieurs	36
3° Le problème des formes enkystées	38
4° Ce qu'on peut conclure de la contamination extra- vénérienne	39
III. — La Trichomonase uro-génitale est une maladie vénérienne	41
I. — Fréquence de l'infestation masculine	41
II. — L'infestation réciproque des partenaires	45
III. — L'infestation chez les prostituées	47
IV. — Précisions sur le coût de contamination	52
V. — La Trichomonase des enfants et des vierges	53
CONCLUSIONS	57
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES	61

Imprimerie Commerciale
de L'ARDENNAIS
CHARLEVILLE